外臺秘要方卷第七 心痛心腹痛及寒疝三十二門

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

心痛方八首
九種心痛方三首
諸蟲心痛方一十八首
冷氣心痛方五首
惡疰心痛方三首
心痛癥塊方二首
心背徹痛方四首
卒心痛方一十四首
中惡心痛方五首
多唾停飲心痛方二首
心下懸急懊痛方四首

心痛不能飲食方二首
久心痛方六首
雜療心痛方三首
腹痛方四首
卒腹痛方七首
心腹痛及脹滿痛方一十首
心腹脹滿及鼓脹方一十四首
卒心腹脹滿方六首
腹脹雷鳴方三首
腹内諸氣及脹不下食方一十一首
灸諸脹滿及結氣法二十二首
胷脅痛及妨悶方四首
脅肋痛方二首
胷膈氣方三首
寒疝腹痛方九首
寒疝心痛方三首
卒疝方三首
七疝方三首
寒疝不能食方四首
寒疝積聚方四首
心疝方四首

心痛方八首

病源心痛者由風冷邪氣乘於心也其痛發有死者有不死者有久成疹者心爲諸藏主而藏神其正經不可傷傷之而痛爲眞心痛朝發夕死夕發朝死心有支別之絡脉其爲風冷所乘不傷於正經者亦令心痛則乍間乍甚故成疹不死

又心爲火與諸陽會合而手少陰心之經也若諸陽氣虛少陰之經氣逆謂之陽虛陰厥亦令心痛其痛引喉是也

又諸藏虛受病氣乘於心者亦令心痛則心下急痛謂之脾心痛也足太陰爲脾之經與胃合足陽明爲胃之經氣虛逆乘心而痛其狀腹脹歸於心而痛甚謂之胃心痛也腎之經足少陰是也與膀胱合膀胱之經足太陽是也此二經俱虛而逆逆氣乘心而痛者其狀下重不自收時若泄寒中爲腎心痛也

診其心脉急者爲心痛引背食不下

寸口脉沈緊苦心下有寒時痛

關上脉緊心下苦痛

左手寸口脉沈則爲陰陰絶者無心脉也苦心下毒痛出第十六卷中

備急療心痛方

桂心末温酒服方寸匕須臾六七服乾薑依上法服之亦佳文仲集驗肘後同忌生葱出第一卷中

延年療心痛茱萸丸方

吴茱萸一兩半 乾薑一兩半 桂心一兩 白朮二兩

人參一兩 橘皮一兩 附子一兩半炮 椒一兩去閉口者及目汗

甘草一兩炙 黄芩一兩 當歸一兩細切

右十一味擣篩爲散蜜丸一服五丸如梧子大日三服稍加至十九十五丸忌猪肉生葱海藻菘菜桃李雀肉等藥盡更合酒飲無在食前後任意出第十五卷中肘後有桔梗一兩

救急療心痛方

取驢糞絞取汁五六合及熱頓服立差肘後同

又方

東引桃枝一握切以酒一升煎取半升頓服大効肘

後同出第八卷中

必効療心痛方

當歸末酒服方寸匕頻服備急文仲同

又方

生油半合溫服差肘後備急張文仲同並出第五卷中

古今録驗療心痛黄連湯方

黄連八兩

右一物㕮咀以水七升煮取一升五合絞去滓適寒温飲五合日三忌猪肉冷水肘後范汪同出第八卷中

九種心痛方三首

廣濟療九種心痛蛔蟲冷氣先從兩肋胷背撮痛欲變吐當歸鶴蝨散方

當歸八分 鶴蝨六分 橘皮六分 人參六分

檳榔人十二分 枳實六分炙 芍藥六分 桂心五分

右八味擣篩爲散空腹煮薑棗飲服方寸匕日二服漸漸加至一匕半不利忌生葱生冷物油膩粘食出第四卷中

千金療九種心痛一蟲心痛二注心痛三氣心痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九去來心痛悉主之并療冷衝上氣落馬墮車附子丸方

附子一兩炮 巴豆人一兩去心皮熬 人參一兩 生狼毒一兩炙令極香

乾薑一兩 食茱萸一兩

右六味擣末蜜和空腹服如梧子三丸一日一服弱者二丸卒中惡心痛口不能言連年積冷流注心胷痛者亦服之好好將息神効不傳忌野猪肉蘆笋必効經心録同

又療九種心痛方

取當太歲上新生槐枝一握去兩頭水三升煮一升頓

服之並出第十三卷中

諸蟲心痛方一十八首

廣濟療諸蟲心痛無問冷熱蛔蟲心痛檳榔鶴虱散方

當歸　桔梗　芍藥　橘皮

鶴虱各八分　人參六分　桂心六分　檳榔十分

右八味擣篩爲散空腹煑薑棗湯服方寸匕漸漸加至二匕

不利忌豬肉生葱油膩小豆粘食等

又療蛔蟲心痛積年久不差方

取苦酒五合燒青錢二文令赤安酒中則取雞子白

一顆去却錢瀉著酒中頓服之差無所忌

又主心腹攪結痛不止仍似有蛔蟲者當歸湯方

當歸　橘皮　細辛　甘草炙

生薑各四分　大黃八分別漬　鶴虱二分

右七味切以水六升煑取二升分溫三服如人行四五里進

一服不利未差三日更作服之忌海藻菘菜生菜救急同

出第四卷中

小品溫中當歸湯療暴冷心腹刺痛面目青肉冷汗出欲霍亂

吐下脈沈細者及傷寒毒冷下清水變作青白滯下及白滯後

還復下清水者悉主之此方可以調諸冷痛也

當歸　人參　乾薑　茯苓

厚朴炙　青木香　桂心　桔梗

芍藥　甘草各二兩炙

右十味切以水八升煑取三升分溫三服日三服不耐青木

香者以犀角一兩代之忌海藻菘菜豬肉醋物生葱等

又凡厥心痛與背相引喜瘈瘲如物從後觸其心身傴僂者腎

心痛也

厥心痛腹脹滿心痛尤甚者胃心痛也

厥心痛痛如錐鍼刺其心心痛甚者脾心痛也

厥心痛色蒼蒼如死灰狀不得太息者肝心痛也千金同

厥心痛臥若從居心間痛動作痛益甚色不變肺心痛也

真心痛手足清至節心痛甚旦發夕死夕發旦死

心腹中痛發作種聚行來上下痛有休止腹中熱喜涎出是蚘蟲咬也出甲乙經第一卷中

千金療心腹中痛發作種聚往來上下痛有休止多熱喜涎出是蚘蟲咬也並宜溫中當歸湯服兩三劑後若不効有異宜改方增損湯其溫中當歸湯在前小品方中此是增損湯方

芍藥六兩　黄芩四兩　厚朴四兩　桔梗四兩

柴胡四兩　當歸三兩　升麻三兩

右七味切以水八升煮取二升半分三服忌猪肉出第十三

卷中

張文仲療蚘蟲心痛鶴蝨散方

鶴蝨二分末溫酢一盞和服之蟲當出備急千金同

又乾漆丸方

乾漆熬擣蜜和丸服十五丸日再備急同

又方

取槐上木耳燒灰末如棗大正發和水服若不止飲熱水一升蚘蟲立出必効方云酒下備急同

又方

發時取鹽一匕內口中水下立定蟲即出備急同出第一卷中

延年療蚘蟲惡吐水心痛鶴蝨丸方

鶴蝨三兩擣篩蜜和爲丸用蜜漿水平旦服二十丸

日只一服各依前不相妨禁肉若不服則得食鍗古今錄驗用十兩去韋雲患心痛十年不可過於雜方內見合服之便差

又鶴蝨丸療蛔蟲心痛方

鶴蝨六兩 吳茱萸五兩 橘皮四兩 桂心三兩

檳榔四兩

右五味擣篩蜜和爲丸如梧子大一服二十丸蜜湯下日二服加至三十丸以蟲出爲度忌生葱出第十五卷中

救急療心痛不可忍似蛔者胡粉丸方

生眞胡麻一合 胡粉半合熬擣

右二味先以猪肉脯一片空腹啖嚥汁勿嚥肉後取胡粉和胡麻搜作丸以少清酒使成頓服盡十歲以上斟酌增減忌生冷猪肉魚雞蒜酢滑等七日若是蛔吐水者是也出第八卷中

必効療蛕於尣切作蛔非心痛方

取鰻鱺魚淡炙令熟與患人喫一二枚永差飽食彌佳

又方

熊膽如大豆和水服大効

又茱萸丸方

吳茱萸一升 桂心二兩 當歸二兩

右三味擣篩蜜和丸如梧子酒服三十丸日再服漸加至四十丸以知爲度忌生葱

又丁香散方

丁香七枚 頭髮灰一棗許

右二味並末和酒服之

又鶴蝨檳榔湯方

鶴蝨二兩小兒用一兩 大腹檳榔二七枚切碎皮子

右二味以豬肉汁六升煮檳榔取三升去滓內鶴蝨末先夜不食明且空腹頓服之須臾病下及吐水永差神効七日禁生

冷酢滑高大處並出第五卷中

冷氣心痛方五首

廣濟主冷氣心痛肋下鳴轉喉中妨食不多消常生食氣每食心頭住不下桔梗散方

桔梗 當歸 芍藥 茯苓

橘皮 厚朴炙 白朮各八分 蓽撥四分

荳蔻子四分 檳榔人六分 桂心六分 訶梨勒皮六分炙

右十二味擣篩為散空腹煮薑棗飲服方寸匕日二服加至一匕半不利忌生葱猪肉酢物桃李雀肉等出第四卷中一方有枳實不用桔梗

深師療胷滿短氣心痛吐虛冷防風茯苓湯方

防風二兩 茯苓二兩 桂心六兩 甘草二兩炙

半夏四兩洗 乾薑四兩炮 人參三兩

右七物切以水一斗煮取三升絞去滓分三服良忌酢物生葱海藻菘菜羊肉餳出第十六卷中

崔氏療心痛與冷氣痛者特相宜烏頭丸方

烏頭三兩炮 附子三兩炮 赤石脂三兩 蜀椒二兩去目及閉口者汗

桂心二兩 乾薑二兩

右六物擣篩蜜和為丸痛發時温清酒服三丸如梧子覺至痛處痛則止若不止加至五六丸以知為度若早朝服無所覺至午時又服三丸暝又服三丸此方丹陽有隱士出山云得華他法其療略同他云若久心痛每旦服三丸稍加至十丸盡一劑遂終身不發忌生葱豬肉張文仲備急同出第四卷中

延年療冷氣刺心痛不能食方

當歸 桂心 桔梗 吴茱萸

人參 白朮 高良薑已上各六分 橘皮三分

右八味擣篩爲散蜜和爲丸如梧子大一服十丸酒下日二服加至十五二十丸爲度忌生葱桃李猪肉雀肉等

又療心痛冷痛腹滿如錐針刺及蟲齧心痛當歸湯方

當歸三兩　桔梗二兩　吴茱萸三兩　桂心三兩

芍藥二兩　大黄二兩

右六味切以水六升煑取三升三合去滓内鶴虱一兩攪温一沸分三服空腹服之微利爲度忌猪肉生葱出第十五卷中

惡疰心痛方三首

廣濟療惡疰撮肋連心痛當歸湯方

當歸八分　青木香六分　白檳榔十顆碎　麝香一銖研

右四味切以小便一大升半煑取六大合絞去滓下麝香末分温三服服別如人行四五里進一服微微利忌生菜熱麪猪犬肉粘食蒜陳臭物出第四卷中

崔氏療疰在心腹痛不可忍方

取東引桃枝削去著皮取白皮一握以水二大升煑取半升一服令盡則差如不定更依前服之無忌

又療心腹痛不可忍似疰病者或暴得惡疰攪刺欲死桃人大黄湯方

鬼箭羽二兩　桃人六十枚去皮尖兩人　芍藥四兩　鬼臼二兩削去皮

橘皮二兩　當歸二兩　生薑五兩　桂心二兩

柴胡二兩　朱砂一兩研湯成下　麝香一分研湯成下　朴消二兩研湯成下

大黄三兩麤切別浸湯欲熟内之

右十三味切以水九升急火煑取三升温分三服如人行相去六七里服但得快利三四行必差忌生葱生血物並出第四卷中

心痛癥塊方二首

廣濟療心痛癥塊硬築心氣欲絶當歸湯方
當歸　桔梗　芍藥各八分　厚朴十分炙
橘皮八分　人參六分　高良薑十分　桃人五十枚去皮尖兩人
生薑八分
右九味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服服別相
去如人行六七里進一服不利忌猪肉生冷油膩雞魚粘食
小豆大蒜出第四卷中
張文仲療心下堅痛大如椀邊如旋柈音盤名爲氣分水飲所結方
枳實七枚炙　白朮三兩
右二味切以水一斗煮取三升分三服腹中軟即當散也備
急肘後同忌桃李雀肉等出第一卷中
心背徹痛方四首　此張仲景傷寒論方
仲景傷寒論心痛徹背背痛徹心烏頭赤石脂丸主之方
烏頭一分炮去皮　附子一分炮去皮　赤石脂二分　乾薑二分
蜀椒一分汗
右五味擣篩蜜和丸先食服如麻子大一服三丸少少加之
忌猪肉冷水千金必効文仲范汪經心録等同出第十五卷中
千金分兩小別
張文仲蜀椒丸療胷中氣滿心痛引背方
蜀椒一升出汗　半夏一升洗　附子一兩炮
右三味擣篩蜜和爲丸如梧子大一服五丸日三忌猪羊肉
餳等出第三卷中
范汪療心下切痛引背胷下畜氣在胃中有宿食茱萸煎方
成擇吴茱萸一升勿㕮咀　蜀椒五升勿㕮咀　甘草二兩炙㕮咀
乾地黄一斤㕮咀
右四味以清酒三升漬三宿絞取汁銅器中煎令沸麥門冬

五升去心乾漆一斤㕮咀内煎中色黃絞去之内成擇六安石斛五兩阿膠一斤白蜜六升凡九味以湯煎令可丸取如棗大含稍稍咽之日三甚者日五六服藥溫中下氣稍益體中病膝脛重痛者加石斛少氣加麥門冬服藥五日愈當下癥奉車都尉陳蓋試有驗忌海藻菘菜蕪荑等

又芫花湯主卒心痛連背背痛徹心心腹並懊痛如鬼所刺絞急欲死者方

芫花十分　大黃十分

右二味擣下篩取四方寸匕著二升半苦酒中合煎得一升二合頓服盡須臾當吐吐便愈老小從少起此療強實人良若虛冷心痛恐未必可服並出第十八卷中

卒心痛方一十四首

肘後療卒心痛方

先煮三沸湯一升以鹽一升合攪飲之若無火以作湯仍可用水鹽或半升服之古今錄驗同

又方

吳茱萸二升　生薑四兩切　豉一升　酒六升

右四味煮取二升半分三服

又方

白艾成熟者三升以水三升煮取一升去滓頓服之若為客氣所中者當吐蟲物出范汪同

又方

取竈下熱灰篩去炭分以布囊盛令灼灼爾更番以熨痛上冷者更熬令熱

又桂心散方

桂心　當歸各一兩　梔子人十四枚

右三味擣爲散酒服方寸匕日三五服亦主久心痛發作有
時節者忌生葱

又桂心丸方

桂心一兩　烏頭一兩炮

右二味擣篩蜜和爲丸如梧子服三丸稍增之忌生葱猪肉

又療暴得心痛如刺苦參湯方

苦參二兩　龍膽二兩　升麻三兩　梔子人三兩擘

右四味切苦酒五升煑取一升分二服當大吐乃差並出第
一卷中

集驗卒心痛桂心湯方

桂心八兩

右一味以水四升煑取一升半分二服肘後范汪千金同忌生
葱出第一卷中

張文仲療卒心痛方

取敗布裹鹽如彈子燒令赤末以酒一柸和服之肘
後備急同出第五卷中

又方

閉氣忍之數十過并以手大指桉心下宛宛中取差
肘後備急同

又方

苦酒一升破雞子一枚著中合攪飲之好酒亦佳肘
後備急范汪同

又方

蒸大豆若煑之以囊盛更番熨心上冷復易之肘後
同並出第十卷中

救急療卒心痛不能起止方

井華水一大升　蜜半合

右二味相和婦人患令男度與飲男夫患令婦人度與飲必愈出第八卷中

必効療卒心痛人參湯方

人參　桂心　梔子擘　黃芩

甘草各一兩炙

右五味切以水六升煮取二升分三服則愈奇効忌海藻菘菜生葱肘後同出第五卷中

中惡心痛方五首

廣濟療卒中惡心腹絞刺痛氣急脹奄奄欲絶瓜蔕散方

雄黃四兩研　赤小豆四分熬　瓜蔕三分

右三味擣篩爲散空肚温漿水服一錢匕半當吐止不吐加至兩錢匕忌生冷油膩粘食陳臭等

又療卒中惡心腹刺痛去惡氣麝香散方

麝香一分研　生犀角二分屑　青木香二分

右三味擣篩爲散空肚以熟水服方寸匕立愈未止更服之不利忌五辛並出第四卷中

集驗療卒暴心痛或中惡氣毒痛不可忍方

大黃四兩　芍藥四兩　升麻三兩　黃芩三兩

鬼箭三兩　鬼臼二兩　桂心二兩　桔梗三兩

柴胡四兩　朱砂二兩別研　朴消二兩

右十一味切以水九升煮取二升七合分三服先分朱砂作三分一服內一分攪朱砂調服之此湯快利若痛不止宜服後方忌猪肉生葱生血物千金同千金云寒氣卒客於五藏六腑中則發心痛方

又方

赤芍藥六兩　桔梗五兩　杏人五兩去尖皮兩人碎

右三味切以水六升煮取二升半分三服日三忌猪肉千金同出第一卷中

千金療卒中惡心痛方

苦參三兩切　好驗醋一升半

右二味以醋煮苦參取八合強人頓服老小二服出第十三卷中

多唾停飲心痛方二首

病源心痛而多唾者停飲乘心之絡故也停飲者水液之所爲也心氣通於口心與小腸合俱象火小腸心之腑也其水氣下行於小腸爲溲便則心絡無有停飲也膀胱與腎俱象水膀胱爲腎之腑主藏津液腎之液上爲唾腎氣下通於陰若腑藏和平則水液下流宣利若冷熱相乘致腑藏不調津液水飲停積上迫於心令心氣不宣暢故痛而多唾也出第十六卷中

范汪療胷中寒熱心痛清唾滿口數數欲吐食不化乾薑丸方

乾薑一分　桂心一分　礬石一分熬令汁盡　半夏一分湯洗

蜀椒一分去閉口者及目汗

右五味擣篩蜜和丸如大豆許服二丸日三不知稍加以知爲度忌生葱羊肉餳出第十八卷中

集驗療心痛唾多似蟲者方

取六畜心隨得生切作四臠刀縱擴各一割破之內少真朱砂著中平旦吞之蟲死愈矣無真朱砂可用雄黃麝香也肘後經心録同出第一卷中肘後云切作十四臠刀縱擴各割之以真丹一兩粉內割中旦悉吞之入雄黃麝香作

心下懸急懊痛方四首

病源心與小腸合爲表裏俱象於火而火爲陽氣也心爲諸藏主故正經不受邪若爲邪所傷而痛則死若支別絡爲風邪所乘

而痛則經久成疢其痛懸急懊者是邪迫於陽氣不得宣暢擁
瘀生熱故心如懸而急煩懊痛也出第十六卷中

仲景傷寒論心下懸痛諸逆大虛者桂心生薑枳實湯主之方

桂心三兩　生薑三兩　枳實五枚炙破四片

右三味切以水六升煑取三升去滓溫分三服忌生葱范汪
同出第十五卷中

肘後薑附丸方

附子二兩炮　乾薑一兩

右二味擣篩蜜和丸如梧子服四丸酒飲並得日三服忌猪
肉冷水出第一卷中本方云治心肺傷動冷痛

古今録驗療人心痛懊憹悁悶築築引兩乳亙或如刺困極桂
心湯方

桂心半兩　茱萸二兩　芍藥三兩　當歸二兩

生薑半斤無生薑以乾薑五兩代之

右五味切以水一斗二升煑取四升服一升晝三夜一良有驗
忌生葱出第八卷中

千金心下痞諸逆懸痛桂心三物湯主之方

桂心二兩　膠飴半斤　生薑二兩

右藥切以水四升煑二味取三升去滓內飴分三服忌生葱
出第十三卷中

心痛不能飲食方二首

病源心痛而不能飲食者積冷在内客於脾而乘心絡故也心
陽氣也冷陰氣也冷乘於心陰陽相乘冷熱相擊故令痛也脾
主消水穀冷氣客之則脾氣冷弱不勝於水穀也心爲火脾爲
土是母子也俱爲邪所乘故痛復不能飲食也出第十六卷中

廣濟療叉心刺肋冷氣結痛不能食高良薑湯方

高良薑十分 當歸十分 橘皮八分 厚朴十分炙

桔梗八分 桃人五十枚去尖皮兩人碎 吳茱萸八分

生薑八分 訶梨勒五分

右九味切以水八升煑取二升八合絞去滓分温三服服别相去如人行六七里再服忌猪肉生冷油膩粘食小豆等出第四卷中

肘後療常患心痛不能飲食頭中疼重烏頭丸方

烏頭六分炮 椒六分汗 乾薑四分 桂心四分

右四味擣末蜜丸酒服如大豆四丸稍稍增之忌生葱出第一卷中

久心痛方六首

病源心爲諸藏主其正經不可傷傷之而痛者則朝發夕死夕發朝死不暇展療其久心痛者是心之支別絡爲風邪冷熱所乘痛也故成疹不死發作有時經久不差也出第十六卷中

廣濟療心痛三十年不差月上旬殺蟲雷丸鶴蝨散方

雷丸八分 鶴蝨八分 貫衆八分 狼牙八分

桂心八分 當歸八分 檳榔人八分

右七味擣篩爲散空腹煑蜜水半雞子許服方寸匕日二服若重不過三服則差不利忌生葱生冷油膩猪魚小豆大蒜等出第四卷中

范汪療久心痛烏頭赤石脂丸方

赤石脂 乾薑 桂心 椒汗去閉口者及目

烏頭炮

右五味等分末之蜜和丸如梧子服三丸日三以知爲度赤石脂當取斑斑赤中者忌猪肉冷水生葱出第十八卷中

必効療三十年心痛方

桃人七枚去皮尖兩人熬

右一味研湯水合頓服酒服亦良肘後經心録同出第五卷中

古今録驗療久心痛腹痛積年定不過一時間還發發甚則數日不能食又便出乾血窮天下方不差甄立言爲處犀角丸服之數日則差方

犀角二分屑　麝香二分碎　朱砂四分光明者研　桔梗二分

莽草二分炙　鬼臼二分　附子二分炮　桂心二分

貝齒五枚　甘草六分　芫花二分熬　巴豆二十枚去心皮

赤足蜈蚣二枚去足炙

右十三味擣篩蜜和丸如梧子飲服一丸日一漸加至三丸以利爲度忌生葱猪肉野猪肉蘆笋生血物出第八卷中

一方無附子千金有雄黄二分

療心痛如蟲齧痛宛轉欲不救方

又濃擣地黄汁和麪作冷淘不用鹽服一頓蟲即出不出再服必出便差正元十年通事舍人崔抗女患心痛垂氣欲絶忽記此方服便吐出一物可方一寸以來狀如蝦蟇無目足微似有口蓋被此物所蝕抗云往年見親表患心痛因偶食地黄餅飥遂吐一蟲猶動其時亦不謂地黄冷淘能害此蟲因盛於小竹筒正食縁其上便以數莖地黄冷淘投於竹筒中須臾視之已化爲水然覺此冷淘殺蟲心痛無不永絶縡自得此方救三四人皆如神効出手抄方

經心録療四十年心痛不差方

黍米瀋汁温服隨多少出第一卷中

雜療心痛方三首

廣濟療心痛又心撮肋心悶則吐血手足煩疼食飲不入桃人

丸方

桃人八分去皮尖兩人熬 當歸六分 芍藥八分 訶梨勒六分

甘草六分炙 延胡索四分 人參六分 檳榔人十四枚

右八味擣篩蜜丸如梧子以酒空腹下二十丸漸加至三十丸日再服取快利忌海藻菘菜生菜熱麪蕎麥猪犬肉粘食出第四卷中

古今録驗眞心痛論手足清至節心痛甚者旦發夕死夕發旦死療心痛痛及已死方

高其枕柱其膝欲令腹皮臧柔灸其臍上三寸胃管有頃其人患痛短氣欲令人舉手者小舉手問痛差緩者止出第八卷中

救急療心痛冷熱方

取伏龍肝末煑水服方寸匕若冷以酒和服差范汪經心録同出第八卷中

腹痛方四首

病源腹痛者由腑藏虛寒冷之氣客於腸胃募原之間結聚不散正氣與邪氣交爭相擊故痛其有冷氣搏於陰經者則腹痛而腸鳴謂之寒中是陽氣不足陰氣有餘者也診其寸口脉沈而緊則腹痛尺脉緊臍下痛脉沈遅腹痛脉來觸觸者少腹痛脉陰弦則腹痛凡腹急痛此裏之有病其脉當沈若細而反浮大故當愈矣其人不即愈者必當死以其病與脉相反故也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云股脛手臂痛法屈一脛臂中所痛者正偃臥口鼻閉氣腹痛以意推之想氣往至痛止俱熱即愈又云偃臥展兩脛兩手仰足指以鼻内氣自極七息除腹中弦急切痛又云偃臥口内氣鼻出之除裏急飽咽氣數十令温中寒乾吐嘔腹痛口内氣七十

所大振腹咽氣數十兩手相摩令熱以摩腹令氣下出第十六卷中

張文仲當歸大黃湯療冷氣牽引腰背脅下腹內痛方

當歸三兩 芍藥八分 桂心三分 乾薑六分

茱萸五分 人參一兩 大黃一兩 甘草二兩炙

右八味切以水六升煮取三升去滓溫服一升日三忌海藻菘菜生葱出第三卷中

范汪四味當歸湯主寒腹痛方

當歸 桂心 乾薑各三兩 甘草二兩炙

右切以水八升煮取三升一服一升日三服虛冷激痛甚者加黃耆芍藥各二兩忌海藻菘菜生葱出第十五卷中千金無甘草有附子一兩

小品療寒冷腹痛茱萸湯方

吳茱萸二兩 甘草炙 人參 桂心各一兩

生薑五兩 半夏一升洗 小麥一升 當歸二兩

右八味切以水一斗五升煮取三升分溫服一升日三服忌海藻菘菜羊肉餳生葱出第一卷中千金桂二兩生薑切一升

古今錄驗芎藭湯療卒寒腹中拘急痛方

芎藭 當歸 桂心 芍藥

甘草炙各一兩 黃芩半兩 乾薑半兩 杏人三十枚去皮尖兩人熬

右八味切以水五升煮取二升分再服忌海藻菘菜生葱出第八卷中

卒腹痛方七首

肘後療卒腹痛方

粳米二升

右一味以水六升煮取六七沸飲之

又方

掘土作小坎以水滿坎中熟攪取汁飲之差並出第一卷中

張文仲療卒腹痛方

令病人卧高枕一尺許柱漆便腹皮踧氣入胷令人爪其齊上三寸便愈能乾咽吞氣數十過者彌佳亦療心痛肘後備急同

又方

灸兩足指頭各十四壯使火俱下良備急肘後同並出第一卷中

千金療胷腹中卒痛生薑湯方

生薑一斤擣取汁 食蜜八兩 醍醐四兩

右三味微火上耗令相得適寒温服三合日三出第十六卷中

集驗療卒腹痛葛氏方

桂末三匕酒服人參上好乾薑亦佳忌生葱肘後文仲同

又方

食鹽一大把多飲水送取吐肘後張文仲同並出第一卷中

心腹痛及脹滿痛方一十首

病源心腹痛者由腑藏虚弱風寒客於其間故也邪氣發作與正氣相擊上衝於心則心痛下攻於腹則腹痛上下相攻故心腹絞痛氣不得息診其脉左手寸口人迎以前脉手少陰經也沉者爲陰陰虚者病苦心腹痛難以言心如寒狀心腹痛痛不得息脉細小者生大堅疾者死心腹痛脉沉細小者生浮大而疾者死其湯熨針石别有正方補養宣導今附於後養生方導引法云行大道常度日月星辰清静以雞鳴安身卧漱口三咽之調五藏殺蠱蟲令人長生療心腹痛出第十六卷中

廣濟療心腹中氣時時痛食冷物則不安穩及惡水桔梗散方

桔梗　茯苓各八分　枳實炙　人參

厚朴炙　芍藥　橘皮各六分　桂心五分

檳榔人八分　麥門冬八分去心

右十味擣篩爲散空肚煮薑棗飲服方寸匕日三服漸加至一匕半熱以茶飲下不利忌猪肉酢物生葱生冷油膩小豆粘食熱麪炙肉等物

又療卒心腹痛氣脹滿不下食欲得瀉三兩行佳當歸湯方

當歸　茯苓　桔梗　橘皮

高良薑　檳榔人各八分　生薑八分

右七味細切以水七升煮取二升三合絞去滓分溫三服服別根去如人行六七里服訖利三兩行宜停後服忌猪肉酢物生冷油膩魚蒜粘食小豆並出第十五卷中

肘後療心腹俱脹痛煩滿短氣欲死或已絶方

梔子十四枚擘　豉七合綿裹

右二味以水二升先煮豉取一升二合去滓内梔子更煎取八合絞去滓服半升不愈者盡服之備急文仲同

又方

烏梅二七枚水五升煮一沸内青大錢二七文煮取一升半強人可頓服羸人分再服當下愈文仲同

又方

茱萸二兩　生薑四兩切　豉三合綿裹

右三味酒四升煮取二升分三服即差

又療心腹相連常脹痛狼毒丸方

狼毒二兩炙　附子半兩炮

右二味擣篩蜜和丸服如梧子一日服一丸二日二丸三日三

丸再一丸至六日服三丸自一至三以爲常服即差當避食忌
猪肉冷水

又方

吴茱萸一合 乾薑四分 附子二分炮 細辛二分
人參二分

右五味擣末蜜和丸如梧子服五丸酒飲並得日三忌猪肉
生菜等並出第一卷中

深師療久寒冷胷膈滿心腹撽痛不能食惡心乏吸吸不足前
胡湯方

前胡一兩 羊脂二兩 大棗二十枚擘 當歸一兩
茯苓一兩 白朮一兩 芍藥六分 桂心一兩
半夏二兩洗 乾薑一兩 麥門冬六分去心 吴茱萸三百粒

右十二味切以水八升煑取三升分三服相去如人行十里進一
服忌酢物生葱羊肉餳桃李雀肉等出第十六卷中

小品當歸湯療心腹撽痛諸虚冷氣滿方

當歸三兩 乾薑四兩 甘草二兩炙 芍藥三兩
厚朴三兩炙 黄耆二兩 蜀椒一兩汗 半夏三兩洗
肉桂三兩 人參三兩

右十味切以水一斗煑取三升二合強人可一升羸人服八合
大冷者加附子一枚炮忌海藻菘菜羊肉餳生葱古今録驗
千金同

古今録驗通命丸療心腹積聚寒中絞痛又心迫滿脅下急繞臍
痛方

大黄 遠志去心 黄芩 麻黄去節
甘草炙已上各四兩 芒消三兩 杏人六十枚去尖兩人熬 豉二合熬
巴豆五十枚去心皮熬別爲脂

右九味擣合下篩蜜和丸如梧子大先食飲服三丸日三忌野猪肉蘆筍海藻菘菜出第八卷中

心腹脹滿及鼓脹方一十四首

病源心腹脹者藏虛而邪氣客之乘於心脾故也足太陰脾之經也脾虛則脹足少陰腎之經也其脉起於足小指之下循行上絡膀胱其直者從腎上入肺其支者從肺出絡於心藏虛邪氣客於三經與正氣相搏積聚在内氣并於脾脾虛則脹故令心腹煩滿氣急而脹也診其脉遲而滑者脹滿也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云伸右脛屈左膝内壓之五息引脾去心腹寒熱胷臆邪脹依經爲之引脾中熱氣出去心腹中寒熱胷臆中邪氣脹滿久行之無有寒熱時節之所中傷名爲眞人之方出第十六卷中

廣濟療心腹脹滿臍下塊硬如石疼痛不止芍藥丸方

芍藥　當歸　白朮　鼈甲炙各八分

訶梨勒十顆去核熬　乾薑　人參各六分　豆蔻

雄雀屎各四分　郁李人十分去皮

右十味擣篩蜜和爲丸如梧子大空肚以酒下二十丸漸加至三十丸日再服不吐不利忌生菜熱麪人莧桃李雀肉蒜粘食等物

又療鼓脹氣急衝心硬鼈甲丸方

鼈甲炙　芍藥　枳實炙　人參

檳榔各八分　訶梨勒　大黃各六分　桂心四分

橘皮四分

右九味擣篩爲末蜜和爲丸空肚以酒服如梧子大二十丸漸加至三十丸日二服微利爲度忌生葱莧菜炙肉蒜麪等

又療鼓脹氣急通草湯方

通草　茯苓　玄參　桑白皮

白薇　澤瀉各三兩　人參二兩　郁李人五兩

澤漆葉切一升

右九味切以水一斗煑取三升去滓分温四服服別相去如人行六七里進一服不利忌熱麪油膩酢粘食等

又療鼓脹上下腫心腹堅強喘息氣急連陰腫坐不得仍下赤黑血汁日夜不停者茯苓湯方

茯苓二兩　防已一兩　橘皮一兩　玄參一兩

黄芩一兩半　澤瀉一兩半　杏人二兩半去尖皮兩人熬　白朮一兩半

大豆一升半　郁李人二兩半　桑白皮二兩　澤漆葉切一升

猪苓一兩半

右十三味切以水一斗先煑桑白皮大豆澤漆葉取五升去滓澄去下淀内諸藥煎取二升絞去滓分三服欵者加五味子二兩停二日服一劑忌酢物桃李雀肉熱麪蒜炙肉粘食油膩等　茯苓一云茯神　防已一云防風

又療患久心痛腹滿并淡飲不下食人參丸方

人參　白朮　枳實各六分　茯苓八分

厚朴六分炙　青木香六分　橘皮五分　大黄六分

檳榔人六分

右九味擣篩蜜和丸空腹煑生薑棗湯下如梧子二十丸日二服漸加至三十丸不利忌酢物桃李雀肉等

又療心腹脹滿柴胡厚朴湯方

柴胡　厚朴炙各十分　茯苓　橘皮

紫蘇各八分　生薑十二分　檳榔人五分末

右七味切以水七升煑取二升五合絞去滓分温三服服別相去如人行六七里進一服微利忌酢物生冷油膩粘食

又療心腹脹滿腹中有宿水連兩肋滿悶氣急衝心坐不得郁李人丸方

郁李人八分 牽牛子六分熬 甘遂四分熬 防葵三分
菴䕡子 桑白皮 檳榔人各四分 橘皮
澤瀉各二分 茯苓 澤漆葉炙 杏人去尖兩人熬各三分

右十二味擣篩蜜和丸空肚飲服如梧子五丸日二服服別一丸微利爲度忌酢物生冷油膩熱麪炙肉蒜等

又療患氣發心腹脹滿兩肋氣急紫蘇湯方

紫蘇一握 訶梨勒皮 當歸 生薑各八分
人參六分 檳榔十顆合子碎 生地黃汁半升

右七味切以水六升煮取二升絞去滓下地黃汁分溫三服服別如人行四五里溫進一服利三兩行忌蕪荑生菜熱麪炙肉魚蒜粘食陳臭等並出第二卷中

深師療腹脹滿彭彭逆害飲食煩熱不得臥流汗厚朴湯方

厚朴炙 桂心 芍藥 半夏洗各三兩
枳實三枚炙 甘草二兩炙 麥門冬四兩去心 黃芩一兩
乾薑二兩

右九味切以水一斗煮取二升半絞去滓服八合日三小便難加朮三兩人參四兩忌生葱海藻菘菜羊肉餳出第十六卷中

千金厚朴七味湯主腹滿氣脹方

厚朴半斤炙 甘草炙 大黃各三兩 大棗十枚擘
枳實五枚大者四破炙 桂心二兩 乾薑五兩

右切以水一斗煮取五升去滓內大黃取四升服八合日三嘔者加半夏五合利者去大黃寒加生薑至半斤忌海藻菘菜生葱羊肉餳出第十六卷中此本仲景傷寒論方

集驗療胷滿有氣心腹脹中冷半夏湯方

半夏洗一升　桂心四兩　生薑切八兩

右三味切以水七升煮取二升絞去滓適寒温飲七合忌羊肉餳生葱等出第六卷中

古今録驗消化丸療人腹脹心滿腸胃結食不消化嘔逆頭痛手足煩疼此方出太醫熟藥常用芫花丸方

芫花熬一兩　大黃　葶藶子熬　甘遂

黃芩各二兩　巴豆四十枚去心皮熬別研　消石一兩

右七味擣合蜜和丸如梧子先食服三丸日再服一方無消石忌野猪肉蘆笋等出第十卷中

必効青木香丸主氣滿腹脹不調不消食兼冷方

青木香六分　檳榔人六分　大黃十二分　芍藥五分

訶梨勒五分　枳實五分炙　桂心四分

右七味擣篩蜜和丸如梧子飲服十五丸左側漸漸常加以利爲度不限丸多少不利者乃至五十六十丸亦得韓同頻服大効古今常用忌生葱

又療腹脹滿堅如石積年不損者方

取白楊東南枝去蒼皮護風細剉五升熬令黃酒五升淋訖則以絹袋盛滓還内酒中蜜封再宿每服一合日三並出第二卷中

卒心腹脹滿方六首

肘後療卒心腹煩滿方

剉薏苡根濃煮取汁服三升

又方

黃芩一兩　杏人二十枚去皮尖兩人熬　牡蠣一兩熬

右三味切以水三升煮取一升頓服之

又方

灸兩手大拇指內邊爪後第一文頭各一壯又灸兩手中央長指爪下一壯愈肘後此方本治卒吐逆

此本在雜療中其病亦是淡飲霍亂之例兼宜依霍亂條中法療之人平居有患者亦少皆因他病兼爲之耳或從傷寒後未復或從霍亂吐下後虛躁或是勞損服諸補藥痞滿或觸寒熱邪氣或食飲協毒或服藥失度並宜各循其本源爲療不得專用此法也並出第一卷中

備急療卒心腹脹滿又胷脅痛欲死方

熱煑湯令灼灼爾以漬手足冷則易秘之肘後張文仲同

又桂心散方

枳實炙　桂心

右二味等分下篩以米汁服一匕忌生葱肘後張文仲同並出第一卷中

救急療卒患心腹脹滿刺痛方

生薑大有功能遠行宜將自隨煑汁服之良患久痢虛損嘔逆不下食見食則吐取三兩細切擣絞取汁微煖點少多蜜頓一服則下食大効出第七卷中

腹脹雷鳴方三首

范汪療腹中寒氣脹雷鳴切痛胷脅逆滿附子粳米湯方

附子一枚炮八破　半夏半升洗去滑　甘草一兩炙　大棗十枚擘

粳米半升

右五味切以水八升煑米取熟去米內藥煑取三升絞去滓適寒温飲一升日三仲景傷寒論同集驗加乾薑二兩忌海藻菘菜猪羊肉餳出第十五卷中

延年療患腹內氣脹雷鳴胷背痛方

丹參　枳實炙各三兩　桔梗　白术

芍藥各二兩　生薑四兩　檳榔人七枚

右七味細切以水九升煮取二升七合去滓分溫三服忌猪肉桃李雀肉生冷油膩魚蒜等出第十五卷中

又丹參湯療腸鳴發則覺作聲方

丹參　茯苓各三兩　桔梗二兩　生薑四兩

細辛　厚朴炙　食茱萸各二兩

右七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服每服如人行七八里忌生菜猪肉酢物出第四卷中

腹内諸氣及脹不下食方一十一首

廣濟療腹内諸氣脹滿昆布散方

昆布　海藻　人參　玄參

橘皮　升麻各三兩　芎藭　桂心

乾薑各二兩　小麥一升大醋一升半漬之一宿出暴醋盡止

右十味擣篩爲散別擣小麥作散合藥散一處更擣千杵酒服方寸匕日三服漸加至二匕不利忌熱麪炙肉生葱蒜粘食等物

又療冷氣薏苡人飯粥方

細伐薏苡人炊爲飯氣味欲匀如麥飯煮粥亦好豉粥並任意無所忌

又療氣蘇子粥方

蘇子不限多少研如麻子作粥依食法著葱豉薑並得無所忌

又療氣膀胱急妨宜下氣方

蕪荑擣和食鹽末令調以綿裹如棗大内下部久時或下惡汁并下氣佳無所忌

又療氣昆布臛法

高麗昆布一斤白米泔汁浸一宿洗去鹹味以水一斗煑令向熟擘長三寸闊四五分仍取葱白一握二寸切斷擘之更合熟煑令昆布極爛仍下鹽酢豉糝調和一依臛法不得令鹹酸以生薑橘皮椒末等調和宜食粳米飯粳米粥海藻亦依此法極下氣大効無所忌

又療心頭冷硬結痛下氣檳榔湯方

檳榔 十顆合子碎 生薑 青木香 各三兩 橘皮

枳實 炙 甘草 炙 大黃 各二兩

右七味切以水六升煑取二升半絞去滓分溫三服服別如人行四五里進一服取微利忌生菜熱麪炙肉海藻菘菜等

又療一切氣妨悶不能食檳榔丸方

檳榔 七箇 芍藥 五分 枳實 七枚炙 人參 五分

大黃 十六分 青木香 六分 桂心 四分

右七味擣篩蜜和丸空腹服如梧子二十丸日再服漸加至二十五丸微溏爲度忌生菜熱麪炙肉蒜粘食生葱等物

又療氣小芥子酒方

小芥子一升擣碎以絹袋盛好酒二升浸之七日空腹溫服三合日二服漸漸加之以知爲度酒盡旋旋添之無所忌

又療久患氣脹烏牛尿方

取烏牛尿空心溫服一小升日一服氣散則止無所忌並出第二卷中

近効燒鹽通一切氣尤療風方

取鹽花以生麻油和之以濕布一片急裹以繩子繫如打牆鎚許大置瓦子上以炭火四面燒望之如火氣訖

更勿加炭待火盡冷訖吹扇去灰收取鹽擣破如患心
腹脹滿氣隔不通取碁子大含嚥之立差如煑訶梨勒
檳榔及茶湯用此鹽療一切病韋特進用之極効驗

又訶梨勒丸療氣脹不下食兼除惡氣方

訶梨勒　青木香

右二味等分擣篩融沙糖和衆手一時捻爲丸隨意服之氣
甚者每服八十丸日再稍輕者每服四五十丸則得性熱者
以生牛乳下性冷者以酒下不問食之前後禮部蕭郎中處
得云自服大効

灸諸脹滿及結氣法二十二首

千金療臚脹脅腹滿法

灸膈俞百壯三報穴在第七椎下兩傍各一寸半翼同

又療脹滿水腫法

灸脾俞隨年壯穴在第十一椎下兩傍各一寸半翼同

又療脹滿雷鳴酒沸法

灸大腸俞百壯三報穴在第十六椎下兩傍各一寸半
翼同

又療脹滿氣聚寒冷法

灸胃管穴在心鳩尾下三寸灸百壯三報之翼同

又療脹滿繞臍結痛堅不能食法

灸中守百壯穴在齊上一寸一名水分翼同

又療脹滿瘕聚帶下疼痛法

灸氣海百壯穴在臍下一寸半忌不可針翼同

又療脹滿結氣如水腫狀小腹堅如石法

灸膀胱募百壯穴在中極齊下四寸翼同

又療脹滿腎冷瘕聚泄痢法

灸天樞百壯翼同（銅人經天樞二穴俠臍二寸）

又療冷脹胷滿心腹積聚痞疼痛法

灸肝俞百壯穴在第九椎下兩傍各一寸半翼同

又療五藏六腑積聚脹滿羸瘦不能飲食法

灸三焦俞隨年壯穴在第十三椎下兩傍各一寸半翼同並出第十六卷中

又療結氣法

扁鵲曰第四椎下兩傍各一寸半名闕俞主胷中膈氣灸隨年壯

又主心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下食不消腸鳴泄痢法

灸太倉穴一名胃募在心下四寸胃管下一寸灸百壯

又主結氣囊裹鍼藥所不及法

灸肓募二穴在從乳頭邪度至臍中屈去半從乳下行度頭是灸隨年壯（銅人腧穴依法量度乃得日月膽募之穴然主療差別肝募期門穴在此穴上五分然主療與此頗同）

又凡臍下撽痛流入陰中發作無時此冷氣療之法

灸臍下三寸名關元百壯

又療短氣不語法

灸肘後兩筋間名天井百壯

又方

灸大椎隨年壯

又方

灸肺俞穴在第三椎兩傍各一寸半百壯

又方

灸肝俞第九椎百壯

又方

灸尺澤百壯

又方

灸手十指頭各十壯

又方

灸小指第四指間交脉上七壯

又少年房室多短氣者法

灸鳩尾頭五十壯並出第十七卷中

胷脅痛及妬悶方四首

病源胷脅痛者由膽與肝及腎之支脉虚爲寒氣所乗故也足少陽膽之經也其支脉從目兊貫皆下行至胷循脅裏足厥陰肝之經也其支脉起足大指聚毛上循入腹貫膈布脅肋足少陰腎之經也其支脉起肺出絡心注胷中此三經之支脉並循行胷脅邪氣乗於胷脅故傷其經脉邪氣之與正氣交擊故令胷脅相引而急痛也診其寸口脉弦而滑弦則爲痛滑則爲實痛則爲急實則爲躍弦滑相搏則胷脅搶息痛也

又卒苦煩滿又胷脅痛欲死候此由手少陽之絡脉虚爲風邪所乗故也手少陽之脉起小指次指之端上循入缺盆布膻中散絡心包風邪在其經邪氣迫於心絡心氣不得宣暢故煩滿乍上攻於胷或下引於脅故煩滿而又胷脅也若經久邪氣留連搏於藏則成積搏於腑則成聚也並出第十六卷中

廣濟療心氣結築心胷脅悶痛不能喫食訶梨勒散方

訶梨勒四顆炮去核　人參二分

右二味擣篩爲散以牛乳二升煑三四沸頓服之分爲二服亦得如人行三二里進一服無所忌

又療胷脅下利腹中脹氣急妬悶半夏湯方

半夏一升洗去滑　生薑一斤合皮切　桂心六兩　檳榔人二兩末

右四味細切以水八升煑取二升四合絞去滓分溫五服服别相去如人行六七里進一服快利爲度忌羊肉餳生葱油膩

小品有吴茱萸三十顆無檳榔人餘並同

又療胷脅妬悶中客氣大便苦難大黄丸方

大黄十二分　厚朴四分炙　枳實四分炙　芒消八分

杏人六分去皮尖兩人熬　葶藶子四分熬

右六味擣篩蜜和丸空腹以飲服如梧子十九日二服稍稍
加以大便微調爲度忌生冷油膩粘食出第二卷中

千金療冷氣脅下往來胸背痛引脅背悶當歸湯方

當歸　芍藥　吳茱萸　桂心
人參　大黃　甘草各二兩　茯苓
枳實各一兩　乾薑三兩

右十味細切以水八升煮取二升半一服八合日三服治尸
注亦佳忌海藻菘菜生葱酢物等出第十六卷中

脅肋痛方二首

小品療脅下偏痛發熱其脈緊弦此寒也當以溫藥下之大
黃附子湯方

大黃三兩　附子三枚炮　細辛二兩

右三味切以水五升煮取二升分三服若強盛人煮取三升
半分爲三服服別如人行四五里進一服仲景同忌猪肉冷
水生菜等

又半夏茯苓湯療胸膈心腹中痰水冷氣心下汪洋嘈煩或水
鳴多唾口清水自出脅肋急脹痛不欲食此皆胃氣弱受冷故
也其脈喜沉弦細遲悉主之方

半夏五兩洗　生薑五兩　茯苓三兩　旋復花一兩
陳橘皮　人參　桔梗　芍藥
甘草各二兩炙　桂心三兩

右十味切以水九升煮取三升分三服欲得利者加大黃須
微調者用乾地黃病有先時喜水下者加白术三兩除旋復
花去下便調差也宜加大黃及乾地黃者並用三兩足也忌
羊肉餳酢物生葱猪肉海藻菘菜集驗同出第一卷中

胸膈氣方三首

廣濟療肖膈氣脹滿喫食心下妨虛熱脚手煩疼漸羸瘦不能食四肢無力枳實丸方

枳實六分　犀角四分　前胡四分　青木香八分

麥門冬八分去心　赤茯苓八分　苦參六分　芍藥六分

右八味擣篩爲末蜜和丸如梧子以飲空腹下二十丸漸加至三十丸日二服不利忌生菜熱麪油膩炙肉酢蒜

又療肖膈滿塞心背撮痛走注氣悶宜服此柴胡湯方

柴胡六分　當歸六分　青木香六分　犀角六分屑

檳榔十箇和子碎　甘草二分炙

右六味切以水七升煮取二升半絞去滓內麝香末分溫三服如人行四五里微利爲度忌海藻菘菜生菜熱麪蕎麥猪魚蒜

又療肖膈間伏氣不下食臍下滿柴胡湯方

柴胡三兩　枳實三兩　生薑三兩　白朮三兩

甘草一兩炙　檳榔七箇合子破

右六味切以水六升煮取二升絞去滓分溫三服服別如人行六七里進一服小弱人微利禁生冷蒜腥海藻菘菜桃李雀肉等並出第一卷中

寒疝腹痛方一十三首

病源疝者痛也此由陰氣積於內寒氣結搏而不散腑藏虛弱風冷邪氣相擊則腹痛裏急故云寒疝腹痛也出第二十卷中

廣濟療丈夫虛勞寒疝腹痛并主產後方

生乾地黃三兩　甘草二兩炙　茯苓二兩　人參二兩

當歸二兩　大棗十四枚擘　白羊肉三斤去脂

右七味切以水三斗先煑羊肉取一斗去羊肉內諸藥煑取五升內葱白一把煑取四升絞去滓分溫五服服別相去如人行十二三里後藥消進少食食消服藥忌蕪荑海藻菘菜

酢物餘無忌出第四卷中

仲景傷寒論寒疝遶臍苦痛若發則白汗出手足厥寒若脉沈弦者二物大烏頭煎主之方

大烏頭十五枚炮不㕮咀　白蜜二斤

右藥以水三升煮烏頭取二升去烏頭內蜜煎令水氣盡得二升強人服七合弱人五合一服不差明日更服日止一服不可再也忌猪肉冷水千金同

又寒疝腹滿逆冷手足不仁若一身盡痛灸刺諸藥所不能治者抵党烏頭桂枝湯主之方

秋烏頭實中大者十枚去皮生用一方五枚　白蜜二斤一方一斤　桂心四兩

右三味先以蜜微火煎烏頭減半去烏頭別一處以水二升半煮桂取一升去滓以桂汁和前蜜合煎之得一升許初服二合不知更服至三合又不復知更加至五合其知如醉狀得吐者爲中病也忌猪肉冷水生葱等范汪方云

桂心三兩　芍藥三兩　甘草二兩炙　生薑三兩切

大棗十二枚擘

右五味切以水七升煮取三升去滓取五合和前烏頭蜜令得一升餘並同前法服仲景傷寒論千金同

又療寒疝腹中痛引脅痛及腹裏急者當歸生薑羊肉湯主之方

當歸三兩　生薑五兩　肥羊肉一斤去脂

右三味切以水一斗合煮取三升去滓温服七合日三痛即當止若寒多者加生薑足前成一斤若痛多而嘔者加橘皮二兩朮一兩合前物煮取三升加生薑者亦加水五升煮取三升二合服之依前經心録范汪同無忌

又療寒疝腹中痛者柴胡桂枝湯方

柴胡四兩 大棗六枚擘 黃芩一兩半 人參一兩半

甘草一兩炙 半夏二合半洗 桂心 生薑各一兩半

芍藥一兩半

右九味以水八升煑取三升去滓溫服一升日三服本云人參湯作如桂枝法加半夏柴胡黃芩復如柴胡法今著人參作半劑忌海藻菘菜羊肉餳生葱並出第十五卷中

小品寒疝氣腹中虛痛及諸脅痛裏急當歸生薑等四味湯主之方

當歸 生薑 芍藥各三兩 羊肉三斤

右藥切以水一斗二升煑肉爛熟出肉內諸藥煎取三升分溫服七合日三數有効古今錄驗經心錄范汪同出第一卷中

集驗療寒疝氣來往衝心腹痛桂心湯方

桂心四兩 生薑三兩 吴茱萸二兩

右三味切以酒一大升煎至三合去滓分溫三服如人行六七里一服忌生葱

又療寒疝下牽少腹痛附子丸方

附子二兩炮去皮 桃人三兩去皮尖兩人熬 蒺藜子一升去角尖熬

右三味擣篩末蜜和丸梧子大空腹酒下十丸漸加至十五丸及二十丸日再服忌生菜熱麪炙肉筍蒜猪魚出第六卷中

又療積年腹內宿結疝冷氣及諸癖癥等香豉丸方

香美爛豉暴乾微熬令香即止

小芥子揀去土石微熬令赤即止各一升

右二味擣篩蜜和丸空腹酒服二十丸漸加至三十丸日二服初服半劑以來腹中微絞痛勿怪之是此藥攻病之候

又療疝瘕冷氣方

採鼠李子日乾九蒸九暴酒浸服三合日兩服漸加至三服能下血及碎肉積滯物

古今錄驗楚王瓜子丸療心腹寒疝脅支滿食飲不化寒中腹痛及嘔痢風痙齊項強急不得俛仰方

桂心五分　茱萸三兩　白薇一分　乾薑四分

烏頭二分炮　椒五分熬汗　芎藭四分　防葵二分

白芷三分

右九味末之合蜜和爲丸如梧子先食服一丸日三不知稍稍增之以腹中溫身中憹憹爲度忌生葱猪肉冷水范汪等同出第八卷中方中無瓜子未詳方名

寒疝心痛方三首

病源夫疝者痛也陰氣積結所生也陰氣不散則寒氣盛寒氣盛則痛上下無常言冷氣上衝於心故令心痛也出第二十卷中

范汪大茱萸丸療心腹寒疝胷中有逆氣時上搶心痛煩滿不得卧面目惡風悸掉惕惕時驚不欲飲食而嘔變發寒熱方

吳茱萸半升　細辛　芍藥　柴胡一方用前胡

旋復花　黃芩　紫菀　人參

白朮　茯苓　乾薑　桂心

附子炮　甘草炙　半夏洗　當歸各半兩

右十六味擣篩以蜜和爲丸如梧子先食服三丸日三不知稍加忌生葱羊肉餳酢物桃李雀肉猪肉生菜海藻菘菜除此更無所忌深師同出第十四卷中一方有蜀椒無桂心又一方有乾地黃無黃芩

小品解急蜀椒湯主寒疝氣心痛如刺繞齊腹中盡痛白汗出欲絶方

蜀椒二百枚汗　附子一枚炮　粳米半升　乾薑半兩

半夏十二枚洗　大棗二十枚擘　甘草一兩炙

右七味切以水七升煑取三升澄清熱服一升不差更服一升數用療心腹痛㽷徼困急欲死解結逐寒上下痛良忌猪羊肉餳海藻菘菜肘後古今錄驗范汪方無甘草餘同經心錄同出第一卷中

古今錄驗療心痛寒疝牡丹丸方

牡丹去心 桂心各二兩 烏頭炮二枚

右三味末之合蜜和爲丸如大豆旦起未食服三丸日二不知稍增之藥少急寧少服并治遁尸發動無烏頭附子亦可用炮之忌胡荽猪肉冷水生葱等出第八卷中

卒疝方三首

集驗療卒疝暴痛方

灸大敦男左女右三壯立已穴在灸經圖上出第六卷中

文仲療卒得諸疝少腹及陰中相引絞痛白汗出欲死方

擣沙參下篩酒服方寸匕立愈肘後備急同

又若不差服諸利丸下之走馬湯亦佳此名寒疝亦名陰疝張仲景飛尸走馬湯方

巴豆二枚去心皮熬 杏人一枚去心皮

右二味取綿纒搥令極碎投熱湯二合捻取白汁服之須臾差未差更一服老小量之通療鬼繫有尸疰者常畜此藥用驗忌野猪肉蘆笋備急同出第十卷中

七疝方三首

病源七疝候七疝者厥疝癥疝寒疝氣疝盤疝胕疝狼疝也厥逆心痛足寒諸飲食吐不下名曰厥疝也腹中氣乍滿心下盡痛氣積如臂名曰癥疝也寒飲食則脅下腹中盡痛名曰寒疝也腹中乍滿乍減而痛名曰氣疝也腹中痛在臍傍名曰盤疝也腹中臍下有積聚名曰胕疝也少腹與陰相引而痛大便難

名曰狼疝也凡七疝皆由血氣虛弱飲食寒温不調之所生也
出第二十卷中
文仲小器七疝丸主暴心腹厥逆不得氣息痛達背脅名曰尸疝心下堅痛不可手迫名曰石疝臍下堅痛得寒冷食輒劇名曰寒疝脅下堅痛大如手痛時出若不痛不見名曰盤疝臍下結痛女人月事不時名曰血疝少腹脹滿引膀胱急痛名曰脉疝悉主之方（臣等看詳七疝已載前序）

椒（四分汗） 桔梗 芍藥 乾薑

厚朴（炙） 細辛 附子（炮各二分） 烏頭（炮一分）

右八味末之蜜和丸服如大豆三丸加至七八丸日三服忌猪肉冷水生菜出第一卷中

古今録驗七疝丸療疝諸寒臍傍痛上叉脅中滿少氣太醫丞樊之方

蜀椒（五分汗） 乾薑 厚朴（炙） 黄芩

細辛 芍藥 桂心（各四分） 桔梗（二分）

烏喙（炮一分） 柴胡（一分） 茯苓（一分） 牡丹皮（一分）

右十二味擣篩蜜和丸梧子大先餔以酒服七丸日三不知漸加以知爲度忌猪肉冷水生葱生菜酢物胡荽范汪同出第十卷中

集驗疝瘕氣桃人湯方

桃人（去皮尖及雙人） 吳茱萸 橘皮 海藻（各三兩）

生薑 茯苓 羌活 蒺藜子（去角各三兩）

右八味切以水三大升煮取九合分爲三服空心服忌酢物

寒疝不能食方四首

深師療虛冷心腹寒疝脅支滿飲食不消腹中痛久痢頸強芎藭丸方

芎藭（七分） 烏頭（炮四分） 防葵（三分） 蜀椒（九分汗）

白薇二分 桂心十分 白芷五分 茱萸六分
乾薑八分
右九味擣篩蜜和丸如梧子飲服二丸日三稍加至五六九以知
爲度忌猪肉冷水生葱范汪同
又主虛冷痰澼疝食不消心腹痛氣弱不欲食虛饜羸瘦吳
茱萸丸方
吳茱萸十分 紫菀三分 白薇三分 烏頭十分炮
桂心六分 前胡 芍藥 細辛
芎藭 黃芩各五分
右十五味下篩蜜和酒服如梧子五丸日三稍加之忌猪肉
冷水桃李生葱生菜等出第十六卷中 謹按別本有此方元欠五味按忌法有桃李即當用白朮恐後古今錄驗治寒疝積聚是全方
范汪療手足熱腹中寒疝不能食飲數心腹痛十一物七熬飯後丸方
茯苓五兩 乾薑六兩今倍十二兩 大黃二斤 柴胡十兩
芎藭七兩 蜀椒一兩汗 芒消一升重十兩今減五合 杏人一升去皮尖兩人熬
葶藶子一升 加桂心五兩 附子三兩炮
右藥乾薑茯苓不熬餘皆熬擣篩以蜜和丸如梧子飲服七
丸日三龍朔元年三月十七日詔書十一物七熬方忌猪肉冷
水醋物生葱等出第十四卷中
集驗療寒疝不能食方
取馬藺子一升每日取胡桃許以麪拌熟煮吞之然
後依常飯日再服服盡必愈亦除腹內一切諸疾消
食肥肌仍時燒塼熱以羖羊毛作氊裹却氊上熨之
日一度尤佳
寒疝積聚方四首
病源夫積聚者由寒氣在內所生也血氣虛弱風邪搏於腑藏

寒多則氣澁氣澁則生積聚也積者陰氣五藏所生始發不離其部故上下有所窮已聚者陽氣六腑所成也故無根本上下無所留止但諸藏腑受邪初未能爲積聚邪氣留滯不去乃成積聚其爲病也或左右脅下如覆杯或臍上下如臂或胃管間覆大如盤羸瘦少氣或洒淅寒熱四肢不收飲食不爲肌膚或累累如桃李或腹滿嘔泄寒則痛故云寒疝積聚也其脉駃(所吏反)而緊積聚浮而牢積聚牢強急者生虛弱急者死出第二十卷中

深師破積丸療寒疝久積聚周走動搖大者如鼈小者如杯乍來乍去在於胃管大腸脹滿不通風寒則腸鳴心下寒氣上搶脅

脅支滿芫花丸方

芫花(一分洗炒)　椒(一分汗)　大黃(六分)　細辛(六分)

桔梗(五分)　烏頭(四分炮)　茱萸　芍藥

茯苓(各三分)　龍膽(二分)　半夏(一分洗)

右十一味擣篩蜜和丸如梧子大飲服五丸日三當下如泥病愈忌猪羊肉餳酢物生菜等

又當歸丸療心腹勞強寒疝邪氣往來牢堅固結聚苦寒煩悁(於緣切下同)不得卧夜苦汗出大便堅小便不利流飲在腹中食不生肌方

桔梗(二分)　葶藶子(五分熬)　藜蘆(二分炙)　厚朴(五分炙)

杏人(五十枚去尖皮兩人熬)　附子(五分炮)　桂心　人參(各三分)

沙參(三分)　特生礜石(一兩燒半日)

右十味擣篩蜜和如梧子服三丸日三稍加之忌猪肉生葱冷水出第二十二卷中

古今録驗療久寒三十歲心腹疝癥瘕積聚邪氣往來厥逆搶心痛大痺羸瘦少氣婦人產乳餘疾胷脅支滿不嗜食手足悁煩月水不通時時便血名曰破積聚烏頭續命丸方

食茱萸(十分)　芍藥(五分)　細辛(五分)　前胡(五分一古柴胡)

乾薑十分 烏頭炮十分 紫菀 黄芩

白朮 白薇各三分 芎藭 人參

乾地黄各五分 蜀椒汗十分 桂心十分

右十五味擣篩蜜和爲丸如梧子大先食服三丸日三不知稍加至七丸忌生菜生葱猪肉冷水桃李雀肉蕪荑等范汪同出第十卷中

集驗療腎冷及疢疝氣滞後灌方

鹽花一大合 漿水半大升

右二味和煖灌下部少間即下膿日一度再灌之即止

心疝方四首

病源心疝者由陰氣積於内寒氣不散上衝於心故使心痛謂之心疝也其痛也或如錐刀所刺或四肢逆冷或脣口變青皆其候也出第二十卷中

范汪療心疝復繞臍痛上支胷心下痛方

芍藥 桔梗 細辛 蜀椒汗

桂心 乾薑各三分 附子炮一分

右七味末之合蜜和爲丸如梧子服七丸以酒下日二服忌猪肉冷水生葱生菜等

又療三十年心疝神方

眞射茵䕡好者 新好茱萸一名殺子

右二味等分擣篩蜜和丸服如麻子二丸日三藥勢盡乃熱食良秘已用得差劉國英所秘

又主心疝方

灸兩足大指甲宍之際甲宍各半炷隨年壯良

又心疝發時心腹痛欲死方

灸足心及足大指甲後横理節上及大指岐間白黑肉

際百壯則止足心者在足下偏近大指本節際不當足心中央也並出第十八卷中

外臺祕要方卷第七

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙　子孟　校勘

外臺祕要方卷第八 淡飲胃反噎鯁等三十門

朝散大夫守光禄卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

淡飲論二首
淡飲食不消及嘔逆不下食方九首
懸飲方二首
溢飲方三首
支飲方九首
留飲方二首
酒澼飲方三首
留飲宿食方七首
淡澼方二首
飲澼方二首
澼飲方七首

吟淡方四首
淡結實及宿食方三首
胷中淡澼方三首
淡厥頭痛方八首
風淡方五首
療諸淡飲方四首
胃反方二十首
脾胃弱不能食方三首
脾胃病日漸瘦困不食方三首
胃實熱方二首
胃虚寒方七首
五膈方八首
七氣方三首
氣噎方六首
諸噎方一十二首
卒食噎方九首
五噎方三首
諸骨哽方三十五首
雜誤吞物方一十七首

淡飲論二首

病源淡飲者由氣脉閉塞津液不通水飲氣停在胷腑結而成淡又其人素盛今瘦水走腸間漉漉有聲謂之淡飲其為病也胷脅脹滿水穀不消結在腹內兩肋水入腸胃動作有聲身體重多唾短氣好眠胷背痛甚則上氣欬逆倚息短氣不得臥其形如腫是也脉偏弦為飲浮而滑為飲其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附于後養生方導引法云左右側臥不息十二通

癖淡飲不消右有飲病右側卧左有飲病左側卧又有不消氣排之左右各十二息癖淡飲出第二十卷中

千金淡飲論問曰夫飲有四何謂師曰有淡飲（一云留飲）有懸飲有溢飲有支飲問曰四飲之證何以爲異師曰其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之淡飲飲後水留在脅下欬唾引痛謂之懸飲飲水過多歸於四肢當汗出而不汗出身體疼重謂之溢飲其人欬逆倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲凡心下有水者築築而悸短氣而恐其人眩而癲先寒即爲虛先熱即爲實故水在於心其人心下堅築築短氣惡水而不欲飲水在於肺其人吐涎沫欲飲水水在於脾其人少氣身體盡重水在於肝脅下支滿嚏而痛水在於腎心下悸夫病人卒飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脉雙弦者寒也皆大下後喜虛耳脉偏弦者飲也肺飲不弦但喜喘短氣支飲亦喘而不能眠加短氣其脉平也留飲形不發作無熱脉微煩滿不能飲食脉沈滑者留飲病病有留飲者脅下痛引缺盆欬嗽轉甚（一云輒已）其人欬而不得卧引項上痛欬者如小兒掣瘲狀夫胸中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛心下有留飲其人背寒冷大如手病人肩息上引此皆有溢飲在胸中久者缺盆滿馬刀腫有劇時此爲氣飲所致也膈上之病滿喘欬吐發則寒熱皆痛惡寒目泣出其人振振身瞤劇必有伏飲病人一臂不隨時復轉移在一臂其脉沈細此非風也必有飲在上膲其脉虛者爲微勞榮衛氣不周故也出第十八卷中

淡飲食不消及嘔逆不下食方九首

病源夫淡水結聚在於胷腑膀胱之間久而不散流行於脾胃脾胃惡濕得水則脹脹則不能消食也或令腹裏虛滿或水穀不消化或時嘔逆皆其候也出第二十卷中

廣濟療心頭淡積宿水嘔逆不下食前胡丸方

前胡　白朮　旋復花

豆蔻人各三分　人參　甘草炙各五分　麥門冬去心各六分　枳實炙

大黃各四分

右九味擣篩蜜和爲丸如梧子大空肚以酒下二十丸漸加至三十丸日再服不利忌桃李雀肉海藻菘菜熱麪炙肉魚蒜粘食生冷等物

又療心胷中淡積氣噎嘔逆食不下方

柴胡　橘皮各六分　茯苓十分　人參

麥門冬去心　雞蘇各八分　生薑二十分　檳榔人四分末湯成下

右八味切以水八升煑取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行七八里進一服未差三日更服一劑以利爲度忌酢物生冷油膩粘食並出第一卷中

千金療淡飲飲食不消乾嘔湯方

澤瀉　杏人去尖皮　枳實炙　白朮各三兩

茯苓　柴胡　生薑　芍藥各四兩

旋復花　人參　橘皮　細辛各二兩

半夏四兩洗

右十三味切以水九升煑取二升七合分爲三服忌桃李雀肉大酢生菜羊肉餳等物

又療胷中淡飲腹中水鳴食不消嘔吐水湯方

大腹檳榔四十枚合子碎　生薑八兩　半夏半升洗

杏人四兩去尖皮熬　橘皮三兩　茯苓五兩　白朮四兩切

右七味切以水一斗煑取三升去滓分三服忌羊肉餳大酢桃李雀肉等古今録驗同並出第十八卷中

范汪薑椒湯主胷中積聚淡飲飲食減少胃氣不足欬逆吐哯方

半夏三兩洗 生薑汁七合 桂心 附子炮
甘草炙 茯苓 桔梗各一兩 蜀椒二合汗
橘皮二兩切

右九味切以水七升煑取二升半去滓內薑汁煎取二升半分三服服三劑佳若欲服大散并諸五石丸必先服此方及進黃耆丸輩必佳忌海藻菘菜羊肉餳生葱猪肉冷水酢物千金翼深師同

又白朮茯苓湯主胷中結淡飲澼結臍下弦滿嘔逆不得食亦主風水方

白朮五兩 茯苓三兩 橘皮 當歸
附子炮各二兩 生薑 半夏各四兩切 桂四兩
細辛一兩一作人參四兩

右九味切以水一斗煑取三升分三服服三劑良忌羊肉餳桃李雀肉猪肉冷水生葱生菜醋物等千金翼同

又旋復花湯主胷膈淡結唾如膠不下食者方

烏頭五枚去皮熬 旋復花 細辛 前胡
甘草炙 茯苓各二兩 半夏一兩洗 生薑八兩
桂心四兩

右九味切以水九升煑取三升分爲三服忌羊肉餳海藻菘菜生葱酢物猪肉冷水等並出第十六卷中

延年茯苓飲主心胷中有停淡宿水自吐水出後心胷間虛氣滿不能食消淡氣令能食方

茯苓三兩 人參二兩 白朮三兩 生薑四兩
枳實二兩炙 橘皮一兩半切

右六味切以水六升煑取一升八合去滓分溫三服如人行八九里進之忌酢物桃李雀肉等仲景傷寒論同出第十七卷中

古今録驗療胷膈淡飲食噉經日則併吐出食皆不消出如初
空腹一兩日聚食還復吐之極不便此由淡飲聚下絶不通服
此丸宣通下氣方
吴茱萸　澤瀉　芍藥　白朮
漢防已　赤茯苓各二兩　蜀大黃二兩
右七味擣篩蜜和爲丸如梧子大飲服二十五丸忌桃李
雀肉酢物出第十九卷中

懸飲方二首

病源懸飲謂飲水過多留在脅下令脅間懸痛欬唾引脅痛故
云懸飲出第二十卷中
范汪大甘遂丸療久澼留水澼飲方
芫花熬　甘遂　葶藶子熬　大黃
苦參　大戟　芒消　貝母

桂心各一兩　杏人三十枚熬　巴豆三十枚去心皮熬　烏喙三分炮令坼
右十二味擣篩其巴豆杏人擣如膏合以蜜和丸如大豆許
服二丸日三服不知稍加以意將息之大佳療大水飲病忌
食蘆筍猪肉生葱等出第十六卷中
千金療懸飲十棗湯方
芫花　甘遂　大戟
右三味等分擣篩以水一升五合煮大棗十枚取八合絞去
滓内藥末強人取一錢匕羸人半錢匕頓服之平旦不下者
益藥半錢下後以糜粥自養出第十八卷中此本仲景傷寒論方

溢飲方三首

病源溢飲謂因大渴而暴飲水水氣溢於腸胃之外在於皮膚
之間故言溢飲令人身體疼重而多汗是其候也出第二十卷中
范汪溢飲者當發其汗大青龍湯主之方

麻黃去節六兩　桂心二兩　甘草炙二兩　生薑三兩
石膏如雞子一枚　杏人四十枚去雙人尖皮　大棗十枚擘
右七味㕮咀以水九升先煑麻黃減二升乃內諸藥煑取三升絞去滓適寒溫服一升溫覆令汗汗出多者溫粉粉之一服汗出者勿復服汗出多亡陽逆虛惡風煩躁不得眠脉微弱汗出惡風不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也忌海藻菘菜生葱出第十六卷中此本仲景傷寒論方

千金溢飲者當發其汗宜青龍湯方
麻黃去節　芍藥　細辛　桂心
乾薑　甘草炙各三兩　五味子半升　半夏半升洗
右八味切以水一斗先煑麻黃減二升乃內餘藥煑取三升去滓溫服一升忌海藻菘菜羊肉餳生菜生葱出第十八卷中此仲景傷寒論小青龍湯也

千金翼大五飲丸主五種飲一曰留飲停水在心下二曰澼飲水澼在兩脅下三曰淡飲水在胃中四曰溢飲水溢在膈上五藏間五曰流飲水在腸間動搖有聲夫五飲者由飲後傷寒飲冷水過多所致方
遠志去心　苦參　烏賊魚骨　藜蘆
白朮　甘遂　五味子　大黃
石膏　桔梗　半夏洗　紫菀
前胡　芒消　栝樓　桂心
蓯蓉　貝母　芫花　當歸
人參　茯苓　芍藥　大戟
葶藶　黃芩各一兩　常山　甘草炙
署預　厚朴　細辛各三分　巴豆三十枚去皮心熬
附子三分炮

右三十三味擣篩蜜和爲丸如梧子大酒服三丸日三稍加之忌狸肉桃李雀肉猪羊肉餳生葱酢物生菜野猪肉蘆笋等胡洽同出第十九卷中

支飲方九首

病源支飲謂水飲停於胷膈之間支乘於心故云支飲其病令人欬逆喘息身體如腫之狀謂之支飲出第二十卷中

深師療心下有支飲其人喜眩（一作苦冒）澤瀉湯方

白朮（二兩）　澤瀉（五兩）

右二物切以水二升煑取一升又以水一升煑取五合合此二汁分爲再服忌桃李雀肉等（此本仲景傷寒論方）

千金療支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯方

葶藶子（熬令紫色擣爲丸如彈丸大）　大棗（二十枚）

右二味先以水三升煑大棗得汁二升内葶藶煎取一升頓服三日服一劑可服三四劑（此本仲景傷寒論方）

又嘔家不渴者爲欲解本渴今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之加茯苓者是也先渴卻嘔此爲水停心下小半夏加茯苓湯主之卒嘔吐心下痞膈間有水目眩悸小半夏加茯苓湯方

半夏（一升洗）　生薑（半斤）　茯苓（四兩）

右三味切以水七升煑取一升五合分再服忌羊肉餳大醋

仲景傷寒論茯苓三兩餘並同

又假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而癲眩水也五苓散主之方

猪苓（去皮）　白朮　茯苓（各三分）　桂心（二分去皮）

澤瀉（五分）

右五味下篩水服方寸匕日三多飲水汗出愈忌桃李雀肉生葱醋物等（此本仲景傷寒論方）

又心下有淡飲胷脅支滿目眩甘草湯主之方

甘草二兩炙 桂心 白朮各三兩 茯苓四兩

右四味細切以水六升煮取三升去滓服一升日三小便當利忌海藻菘菜生葱桃李醋物等 此本仲景傷寒論方

又夫酒客欬者必致吐血此坐而極飲過多所致也其脉虛者必冒其人本有支飲在胷中也支飲胷滿厚朴大黃湯主之方

厚朴一兩炙 大黃六兩 枳實四兩炙

右三味細切以水五升煮取二升去滓分温再服之 此本仲景傷寒論方

又夫上氣汗出而欬者此爲飲也乾棗湯主之若下後不可與也乾棗湯主腫及支滿澼飲方

大黃 大戟各一兩 芫花炒 蕘花各半兩

甘草炙 甘遂 黃芩各一兩 乾棗十枚

右八味切以水五升煮取一升六合分四服空心服以快下爲佳忌海藻菘菜

又膈間支飲其人喘滿心下痞堅面黧黑其脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之方

木防已三兩 石膏雞子大十二枚碎綿裹 桂心二兩 人參四兩切

右四味以水四升煮取二升去滓分再服虛者即愈實者三日復發則復與不愈者宜去石膏加茯苓芒消湯方

木防已三兩 桂心二兩 人參 茯苓各四兩

芒消三合

右五味以水六升煮四味取二升去滓内芒消分温再服取微下利則愈忌生葱深師同並出第十八卷中 此本仲景傷寒論方

留飲方二首

病源留飲者由飲酒後飲水多水氣停留於胷膈之間而不宣散乃令人脅下痛短氣而渴皆其候也出第二十卷中

范汪海藻丸療腹中留飲方

海藻　木防已　甘遂　蓯蓉

椒熬　芫花熬　葶藶子熬各一兩

右七味擣篩蜜和爲丸如梧子服十丸不差當增之出第十六卷中

千金療病者脉伏其人欲自痢痢者反快雖利心下續堅滿此爲留飲欲去故也甘遂半夏湯主之方

甘遂大者三枚　半夏十二枚洗以水一升煮取半升去滓　芍藥一兩又云三枚

甘草如指大一枚炙以水一升煮取半升去滓

右四味以蜜半升内藥汁及蜜合一升煎取八合頓服之忌海藻菘菜羊肉餳出第十八卷中此本仲景傷寒論方

酒澼飲方三首

病源夫酒澼者因大飲酒後渴而引飲無度酒與飲俱不散停滯在於脅肋下結聚成澼時時而痛因却呼爲酒澼其狀脅下弦急而痛出第二十卷中

深師消飲丸療酒澼飲酒停淡水不消滿逆嘔吐目視茫茫耳聾腹中水聲方

乾薑　茯苓各三兩　白朮八兩　枳實四枚炙

右四物擣篩蜜和丸服如梧子五丸日三稍加之若下去枳實加乾薑二兩名爲五飲丸忌桃李雀肉大醋生冷之類大神驗

又倍朮丸療五飲酒澼方

白朮一斤　桂心　乾薑各半斤

右三味擣篩蜜和丸如梧子飲服十丸稍加之取下先食服之日再常將不復取下忌桃李雀肉生葱

又温脾丸療久寒宿食酒澼方

乾薑（三兩熬黃） 芍藥（三兩熬干） 蜀椒（二兩汗） 大黃（八兩切熬令黃黑）
小草（一兩熬干） 芎藭（熬黃） 茯苓 桃人（去尖皮熬）
柴胡（熬干各三兩）

右九味擣篩蜜和更擣萬杵服如大豆許十九日三忌大醋並出第二十三卷中

留飲宿食方七首

病源留飲宿食者由飲酒宿食後飲水多水氣停留於脾胃之間脾得濕氣則不能消食令人噫氣酸臭腹脹滿亦壯熱或吞酸所以謂之留飲宿食也出第二十卷中

深師通草丸療積聚留飲宿食寒熱煩結長肌膚補不足方

椒目 附子（炮） 半夏（洗） 厚朴（炙各一兩）
芒消（五兩） 大黃（九兩） 葶藶子（三兩熬） 杏人（三兩去尖皮熬）

右八味擣篩爲末別擣葶藶杏人令如膏合諸末以蜜和丸擣五千杵服如梧子二丸忌猪羊肉餳等大効出第二十三卷中（方中無通草未詳其名）

范汪千金丸療心腹留飲宿食方

沙參 丹參 苦參 桂心（各二分）
石膏（五分研） 人參（一分） 大黃（一分） 半夏（五分洗）
乾薑（五分） 戎鹽（一分） 巴豆（六十枚去皮心以湯百練之復熬令黃色別研）
附子（一分炮）

右十二味皆擣合以白蜜和如小豆吞一丸日再令人先食服一丸不知稍益以知爲度忌猪肉冷水羊肉餳蘆笋生葱

又療留飲宿食桑耳丸方

桑耳（二兩） 巴豆（一兩去皮熬蒸五升米下）

右二味擣和以棗膏丸如麻子先食服一丸不下服二丸病下即止忌野猪肉蘆笋

又主留飲宿食芫花丸方

芫花一兩熬　大黃　甘遂　黃連

麻黃去節　杏人去尖皮兩人熬各三兩　甘草炙　附子炮令坼各一兩

巴豆五十枚去心皮湯練百遍令變色

右九味擣篩杏人巴豆別擣如膏合和以蜜丸如小豆先食服一丸日再不知稍增以知爲度忌海藻菘菜猪肉冷水蘆笋等

又順流紫丸療百病留飲宿食心下伏痛四肢煩疼男子五勞七傷婦人產有餘疾等方

當歸　岱赭各一分　茯苓　烏賊魚骨

桂心各三分　肉蓯蓉二分　藜蘆五分小熬　巴豆六十枚去心皮熬

右八味擣篩白蜜和丸先食服如小豆一丸日再不知增之欲下倍服之別擣巴豆令如膏忌生葱狸肉酢物野猪肉蘆笋等並出第十六卷中

千金療留飲宿食不消腹中積聚轉下當歸湯方

當歸　人參　桂心　甘草炙

芒消　芍藥各二兩　大黃四兩　生薑

黃芩　澤瀉各三兩

右十味切以水一斗煑取三升分三服空心食後服忌生葱海藻菘菜出第十八卷中

集驗淡飲積聚嘔逆兼風虛勞陰疝方

霜後蒺藜苗子擣汁一石先以武火煎減半即以文火煎攪勿停手候可丸止空腹酒下梧子大三十丸煎服亦得出第五卷中

淡澼方二首

病源淡澼者由飲水未散在於胷府之間因遇寒熱之氣相搏沉

滯而成淡也淡之停聚流移於脅肋之間有時而痛則謂之淡澼出第二十卷中

延年療左肋下停淡澼飲結在兩脅脹滿羸瘦不能食食不消化喜唾乾嘔大小便或澀或利或赤或黃腹中有時水聲腹內熱口乾好飲水漿卒起頭眩欲倒脅下痛旋復花丸方

旋復花五分 大黃七分蒸 茯苓三分 澤瀉四分

人參 桂心 皂莢去皮子炙 附子炮去皮各二分

芍藥四兩 蜀椒三分去目汗 乾地黃四分 防葵取水中浮者

乾薑 枳實炙 杏人去雙人尖皮熬別擣作脂各三分

葶藶子四分熬令紫色別擣

右十六味擣篩爲末內杏人葶藶脂中碎研調篩度蜜和爲丸每食後少時白飲服三丸如梧子日二服稍增以微利爲度禁食猪肉魚麪蒜生葱酢今既在肋下有澼氣水飲結聚不散數發則悶刺心痛又未曾服如此破澼飲藥雖服補藥澼氣不除終是不損恐又積聚更急飲食減少此方正與澼氣相當更有三兩種毒藥今商量除訖其方內有附子及別本續命丸有烏頭此並破澼疾不得不用復聽臨時不如服烏頭丸澼氣得減亦未必須服旋復花丸忌酢物生葱猪肉蕪荑出第十六卷中

集驗療痰澼心腹痛兼冷方

鼈甲炙 柴胡 赤芍藥各八分 甘草炙

枳實炙 生薑 白朮各六分 檳榔七箇末湯成後下

右八味切以水六升煑七味取二升半去滓內檳榔末分服八合當利忌海藻菘菜莧菜桃李雀肉等出第五卷中

飲澼方二首

病源飲澼者由飲水過多在於脅下不散又遇冷氣相觸而痛

呼爲飲癖也其狀脅下弦急時有水聲出第二十卷中

深師附子湯療氣分心下堅如盤邊如旋桮水飲所作此湯主之方

桂心三兩 生薑三兩 麻黃三兩去節 甘草二兩炙

細辛三兩 大附子一枚炮 大棗十二枚擘

右七味切以水七升先煮麻黃再沸掠去沫乃下諸藥煮取二升去滓分服七合當汗出如蟲行皮中即愈神驗忌海藻菘菜猪肉生葱冷水生菜等並出第二十二卷中仲景傷寒論名桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯

備急療心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作枳實朮湯方

枳實七枚炙 白朮三兩

右二味切以水一斗煮取三升分三服腹中輭即散此出姚大夫方忌桃李雀肉等物出第三卷中此本仲景傷寒論方

癖飲方七首

病源此由飲水多水氣停聚兩脅之間遇寒氣相搏則結聚而成塊謂之癖飲在於兩脅下弦亘起按之作水聲也出第二十卷中

深師朱雀湯療久病癖飲停淡不消在胷膈上液液時頭眩痛苦攣眼睛身體手足十指甲盡黃亦療脅下支滿飲輒引脅下痛方

甘遂 芫花各二分 大戟三分

右三味爲散以大棗十二枚擘破以水六升先煎棗取二升內藥三寸方匕更煎取一升二合分再服以吐下爲知未知重服甚良無比出第二十三卷中

千金中候黑丸療癖飲停結悶滿目闇方

巴豆八分去皮心熬 芫花三兩熬 桂心四分 桔梗四分

杏人五分去尖皮熬令熟

右五味擣篩蜜和丸飲服如胡豆三丸日一稍增得快下爲
度忌猪肉蘆笋生葱等肘後同

千金半夏湯療淡冷癖飲胷膈中不理方

白术三兩　半夏一升洗　生薑八兩　茯苓二兩
人參　桂心　甘草　附子炮各二兩

右八味切以水八升煑取三升絞去滓分温三服忌羊肉餳
桃李雀肉大酢生葱海藻菘菜猪肉冷水

又旋復花丸療停淡癖飲結在兩脅腹脹滿羸瘦不能食食不
消化喜唾乾嘔大小便或澀或痢水在腸胃動揺作水聲方

旋復花　桂心　枳實炙　人參各五分
乾薑　芍藥　白术各六分　茯苓
狼毒炙　烏頭炮　礜石燒各八分　細辛
大黃　黃芩　葶藶子熬　厚朴炙

芫花熬　吳茱萸　橘皮各四分　甘遂三分

右二十味擣篩蜜和丸酒服如梧子五丸日再服加之以知
爲度忌生葱桃李雀肉大酢猪肉生菜等大驗並出第十八
卷中

千金翼前胡湯主胷中久寒癖實宿淡膈塞胷痛不通利三焦
冷熱不調食飲損少無味或寒熱體重卧不欲起方

前胡三兩　生薑四兩　黃芩一兩　人參二兩
吳茱萸一兩　大黃二兩　防風一兩　杏人三十枚去皮尖熬
當歸　甘草各二兩炙　半夏三兩洗　麥門冬一兩去心

右十二味切以水一斗煑取三升去滓分温三服日三服三
劑良深師云若脅下滿加大棗二枚利水亦佳忌海藻菘菜
羊肉餳

又半夏湯主淡飲癖氣吞酸方

半夏三兩洗　生薑六兩切　附子一枚燒　吴茱萸三百粒炒

右四味切以水五升煮取二升半去滓分温三服老小服半合日三服忌猪羊肉餳

又薑附湯主淡澼氣方

生薑八兩切　附子四枚生用四破

右二味水五升煮取二升分再服亦主卒風大良忌猪肉冷水深師同出第十九卷中

冷淡方四首

病源冷淡者言胃氣虚弱不能宣行水穀故使淡水結聚停於胷膈之間遂令人吞酸氣逆四肢變青不能食飲出第二十卷中

范汪病淡飲者當以温藥和之療心腹虚冷遊淡氣上胷脅滿不下食嘔逆胷中冷半夏湯方

半夏一升洗　生薑一斤　橘皮四兩

右三味切以水一斗煮取三升分三服若心中急及心痛内桂心四兩若腹痛内當歸四兩羸瘦老小者服之佳忌羊肉餳

又方

半夏一升湯洗　生薑一斤　桂心三兩　甘草三兩炙

右四味切以水七升煮取二升半分三服忌海藻菘菜羊肉餳生葱並出第十六卷中

千金茯苓湯主胷膈淡滿方

茯苓四兩　半夏一升洗　生薑一斤　桂心八兩

右四味切以水八升煮取二升半分四服冷極者加大附子四兩氣滿者加檳榔三七枚忌酢物羊肉生葱餳出第十八卷中

千金翼論曰凡淡飲盛吐水無時節其源爲冷飲過度遂令固冷脾胃氣羸不能消於食飲食飲入胃皆變成冷水反吐不停

者赤石脂散主之方

赤石脂（三斤）

右一味擣下篩服方寸匕日三酒飲並可稍稍加至三匕服盡三斤則終身不吐水又不下利補五藏令肥健有人一名淡飲諸藥不差惟服此一斤則愈出第十九卷中

淡結實及宿食方三首

病源此由淡水積聚在於胷府遇冷熱之氣相搏結實不消故令人心腹痞滿氣息不安頭眩目暗常欲嘔逆故言淡結實出第二十卷中

集驗療宿食結實及淡澼癖實瓜蔕散方

瓜蔕（一兩） 赤小豆（四兩）

右二味擣篩温湯三合以散一錢匕投湯中和服之須臾當吐不吐更服半錢湯三合令吐如吐不止飲冷水備急救急

同出第四卷中

千金松蘿湯主胷中淡積熱皆除之方

松蘿（二兩） 烏梅 梔子（各二七枚） 常山（三兩）

甘草（一兩炙）

右五味切以酒三升漬一宿平旦合水三升煑取二升半去滓頓服之亦可再服得快吐止忌海藻菘菜生葱菜

又撩膈散療心上結淡實寒冷心悶方

瓜丁（二十八枚） 赤小豆（二十枚） 人參 甘草（各一分炙）

右四味擣爲散酒服方寸匕日二亦療諸黃忌海藻菘菜並出第十八卷中

胷中淡澼方三首

肘後療胷中多淡頭痛不欲食及飲酒則瘀菹淡方

礬石（一兩）

右一味以水二升煑取一升內蜜半合頓服之須臾未吐飲
少熱湯

又方

杜蘅三兩 瓜蔕三七枚 松蘿三兩

右三味切以水酒一升二合漬之再宿去滓温分再服一服
不吐晚更一服千金同並第三卷中

千金治膈湯主胷中淡澼方

常山三兩 甘草一兩 松蘿一兩 瓜蔕二七枚

右四味酒水各二升半煑取一升半初服七合取吐吐不盡
餘更分二服得快吐差後須服半夏湯在前冷淡部中忌
海藻菘菜生葱生菜備急肘後同出第十八卷中

淡厥頭痛方八首

病源謂淡水在於胷膈之上又犯大寒使陽氣不行令淡水結

聚不散而陰氣逆上上與風淡相結上衝於頭即令頭痛或數
歲不已久連腦痛故云膈淡風厥頭痛若手足寒冷至節則死
出第二十卷中

千金療卒頭痛如破非中冷又非中風其病是胷膈中淡厥氣
上衝所致名爲厥頭痛吐之則差方

但單煑茗作飲二三升許適冷煖飲三升須臾適吐
適吐畢又飲能如此數過劇者須吐膽汁乃止不損
人渴而則差集驗同出第十八卷中

千金翼葱白湯主冷熱膈淡發時頭痛悶亂欲吐不得方

葱白二七莖 烏頭二分炮 甘草二分炙 眞朱二分研
常山二分 桃葉一把

右六味切以酒四升水四升合煑取三升去滓內眞朱服一
升得吐止忌海藻菘菜猪肉冷水生葱生菜生血物等千金

深師同

又療淡飲頭痛往來寒熱方

常山一兩　雲母粉二兩

右二味爲散熟湯服方寸匕吐之止若吐不盡更服忌生葱生菜深師云用雲母半兩鍊之餘同並出第十九卷中

備急葛氏主卒頭痛如破非中冷又非中風是胸膈中淡厥氣上衝所致名厥頭痛吐即差療方

釜下墨四分　附子三分炮

右二味擣散以冷水服方寸匕當吐愈一方有桂心一分忌猪肉冷水文仲肘後同

又方

以鹽湯吐不吐摘出張文仲同

又方

苦參　桂心　半夏洗

右三味等分爲末苦酒和以塗痛上則差忌生葱羊肉餳肘後同

又方

常山四分　甘草半兩

右二味切以水七升煮取三升服一升不吐更服亦可內蜜半升忌生葱生菜海藻菘菜千金肘後延年同

又方

烏梅三十枚　鹽三指撮

右二味以酒三升煮取一升一服當吐愈肘後同

風淡方五首

延年白朮丸主除風淡積聚胃中冷氣秋發動令人嘔吐食或吐清水食飲減少不作肌膚方

白朮五分　白芷三分　乾薑　石斛各六分

五味子　細辛　橘皮　厚朴炙
桂心　防風　茯苓　甘草各四分
右十二味擣篩蜜和丸如梧桐子服十丸飲下日二加至二十丸忌桃李雀肉生葱海藻菘菜生菜酢物蒜孝璋處一方有人參五分十三味
又茯苓湯主風淡氣發即嘔吐欠呿煩悶不安或吐淡水者方
茯苓三兩　人參　生薑　橘皮
白朮各二兩
右五味切以水五升煑取一升五合去滓溫分三服中間任食忌大醋桃李雀肉等出第十七卷中
又木蘭湯主熱淡飲氣兩肋滿痛不能食者方
木蘭　枳實炙　黃芩　白朮各三兩
漏蘆根　白斂　升麻　芍藥
桔梗各二兩　生薑　大黃各四兩

右十一味以水八升煑取二升六合分爲三服如人行三四里進一服忌桃李猪肉雀肉一方有玄參二兩
又茯苓飲主風淡氣吐嘔水者方
枳實一兩炙　茯苓　白朮　人參各二兩
生薑四兩　橘皮一兩半
右六味切以水五升煑取一升半分三服中間任食忌桃李雀肉大醋張文仲處並出第六卷中
又療風淡飲氣逆滿惡心不能食方
人參二兩　枳實炙　白朮各三兩　生薑四兩
桂心一兩半
右五味切以水五升煑取一升五合分溫三服忌桃李雀肉生葱張文仲處出第十七卷中
療諸淡飲方四首

廣濟療飲氣淡膈食則嘔吐方

茯苓八分 橘皮六分 甘草四分炙 生薑八分

雞蘇六分 人參四分

右六味切水五升煑取一升五合去滓分溫二服服別相去如人行六七里進一服不利忌海藻菘菜酢物出第一卷中

千金順流紫丸療心腹積聚兩脅脹滿留飲淡澼大小便不利小腹切痛膈上寒方

岱赭三分 烏賊魚骨三分炙 半夏三分洗

巴豆七分去心皮熬 桂心四分 石膏五分研

右六味擣篩蜜和丸平旦服一丸如胡豆至二丸忌羊肉餳猪肉蘆笋生葱出第十八卷中

延年前胡湯主胷背氣滿膈上熱口乾淡飲氣頭風旋方

前胡三兩 枳實炙 細辛 杏人去皮尖碎

芎藭 防風 澤瀉 麻黃去節

乾薑 芍藥已上各三兩 茯苓一作茯神 生薑各四兩

桂心 甘草炙各二兩

右十四味切以水九升煑取二升六合分三服微汗忌生冷油滑猪牛肉麪海藻菘菜生葱生菜酢物出第十七卷中

古今録驗薑附湯療冷胷滿短氣嘔沫頭痛飲食不消化方

附子六分 生薑十二分

右二味切以水八升煎取三升二合分爲三服忌猪肉冷水等出第九卷中

胃反方二十首

病源夫榮衛俱虛血氣不足停水積飲在於胃管則藏冷藏冷而脾不磨脾不磨則宿穀不化其氣逆而成胃反也則朝食暮吐暮食朝吐心下牢大如柸往來寒熱甚者食已則吐其脉緊

而弦緊則爲寒弦則爲虚虚寒相摶故食已則吐名爲反胃也
出第二十一卷中
集驗療胃反不受食食已嘔吐大半夏湯方
人參一兩 茯苓四兩 青竹茹五兩 大黃六兩
橘皮 乾薑各三兩 澤瀉 甘草炙
桂心各二兩
右九味切以水八升煑取三升服七合日三夜一已利去大黃用泉水東流水尤佳忌海藻菘菜生葱大酢千金備急張文仲同方中無半夏未詳其名
又療胃反吐而渴者茯苓小澤瀉湯方
茯苓 澤瀉 半夏各四兩洗 桂心
甘草各二兩炙
右五味以水一斗煑取二升半去滓服八合日三忌海藻菘菜羊肉餳生葱酢物等千金加生薑四兩
又療胃反朝食暮吐食訖腹中刺痛此由久冷者方
橘皮三兩 白朮 人參各二兩 椒一百二十粒出汗
桂心一兩 薤白一握去青
右六味切以水二升漬一宿内猪肚中縫合三升水煑水盡出之決破去滓分三服忌桃李雀肉生葱千金用羊肚
又療胃反大驗方
前胡 生薑各四兩 阿膠一兩 大麻子人熬
吴茱萸各五合 桂心三寸 甘草五寸炙 大棗十枚擘
右八物切以酒二升水三升煑取一升七合分再服忌生葱海藻菘菜等物一方有橘皮三兩
又療胃反吐食者方
擣粟米作粉水和作丸如梧子大七枚爛煑内酢中

細細呑之得下便已麪亦得用之

又方

好麪十斤麤地黃二斤二味擣日乾酒服若飲三方寸匕日三服千金云治酢咽

又主胃反食則吐出上氣者方

灸兩乳下各一寸以差爲度

又方

灸臍上一寸二十壯

又方

灸內踝下三指稍邪向前有穴三壯即差

又方

蘆根　茅根各二兩

右二味切以水四升煑取二升頓服得下食並出第十六卷中以上並與千金同

崔氏療食則吐或朝食夜吐名曰胃反或氣噎不飲食數年羸削唯飲水亦同此方朱靈感錄送

半夏六兩削去皮湯洗　人參三兩　生薑一兩　橘皮二兩

舂杵頭糠一升綿裹　牛涎一升　厚朴二兩炙　羚羊角三兩削

右八味切以水八升煑取三升分溫三服相去十里久欲頻服者可至三劑氣噎病者胃閉不受食唯飲水水入吐出積年不差乃至於死人間多有此病此方救療有効忌羊肉餳粘食

又華他療胃反胃反爲病朝食夜吐心下堅如杯往來寒熱吐逆不下食此爲寒癖所作療之神効方

眞珠　雄黃　丹砂以上研各一兩　朴消五兩

乾薑十累

右五味擣篩蜜丸先食服如梧子二丸小煩者飲水則解之忌生血物備急集驗千金張文仲同並出第四卷中一方有桂心一兩必效云治心一堅痛胃反寒癖所作久變成肺痿方

救急療胃反方

昔在㓜年經患此疾每服食餅及羮粥等物須臾吐出正觀中許奉御兄弟及柴蔣等家時稱名醫奉勑令療罄竭口馬所患終不能瘳漸羸憊候絶朝夕忽有一衛士云服驢小便極驗此日服食二合然後食唯吐一半晡時又服二合人定時食粥吐便即定迄至今日午時奏知之大內中有五六人患胃反同服用一時俱差此藥稍有毒服時不可過多承取尿及熱服二合病若深七日以來服之良後來療人並差必効同出第六卷中

必効人參湯主胃逆不消食吐不止方

人參　澤瀉　桂心各二兩　橘皮

甘草炙　黃耆各三兩　茯苓四兩　生薑八兩

加至三十丸腹中有痛加當歸二兩忌熱麪海藻菘菜桃李雀肉等出第一卷中

延年人參飲主虛客熱不能食惡心方

人參　麥門冬去心　橘皮　白朮

厚朴各二兩炙　茯苓四兩　生薑三兩切　甘草一兩炙切

右八味切以水八升煮取三升分爲三服日三忌海藻菘菜桃李雀肉等蔣孝瑜處大効

又厚朴湯療不能食腹內冷氣方

厚朴三兩炙　白朮　人參各二兩　茯苓三兩

生薑五兩　橘皮二兩

右六味切以水四升煮取一升二合分爲三服忌桃李雀肉酢物蔣孝瑜處出第六卷中

脾胃病日漸瘦困不食方三首

廣濟主脾胃中熱消渴小便數骨肉日漸消瘦方

黄連　麥門冬各十二分去心　苦參　栝樓

知母　茯神　土瓜根各八分　人參

甘草炙各六分

右九味擣篩蜜和丸每食後少時煑蘆根大麥飲服如梧子二十九日二服漸加至四十九丸不利忌海藻菘菜猪肉冷水酢物等

又主胃氣冷弱食則吐逆從朝至夜不得食食入腹則脹氣滿急大便出飯粒如故帶酸氣而羸計日漸困者方

吴茱萸二兩　白朮三兩　人參　乾薑

甘草炙　五味子各二兩　麴末　麥蘖各五合熬令黄色

厚朴一兩半　桂心一兩

右十味擣篩爲散空腹煑生薑湯服方寸匕一日三服漸加

麥門冬二升去心　半夏一升洗　大黄一兩半

右十一味切以水一斗二升煑取三升二合服八合日三夜一服若羸人服六合已下去大黄忌海藻菘菜酢物生葱羊肉餳千金同

又療胃反朝食夜吐夜食朝吐諸藥療不差方

羊肉去脂膜作生以好蒜虀空腹任意多少食之立見効驗

又療胃反吐水及吐食方

大黄四兩　甘草二兩炙

右二味切以水三升煑取一升去滓分温再服如得可則隔兩日更服一劑神驗千金不傳忌海藻菘菜並出第二卷中此本仲景傷寒論方

萬全方療脾飲食吐逆水穀不化此爲胃反半夏飲子方

半夏八分湯洗滑盡 厚朴炙 人參 白朮
生薑切 棗各六分 半夏八分湯洗滑盡 厚朴六分炙
粳米兩合 橘皮四分 京棗七枚 生薑六分切

右六味細切以水二大升煎取一升去滓分温四服空肚服二服忌羊肉餳並出第一卷中

脾胃弱不能食方三首

病源脾者藏也胃者腑也脾胃二氣相爲表裏胃爲水穀之海主受盛飲食者也脾氣磨而消之則能食今脾胃二氣俱虚弱故不能食也尺脉浮滑速疾者食不消脾不磨也出第二十一卷中

廣濟療脾胃氣微不能下食五内中冷時微下痢方

白朮八兩 神麴五兩末熬香 甘草二兩炙 乾薑二兩
枳實二兩炙

右五味擣篩蜜和丸空腹温酒服如梧子二十丸日二服漸至二匕忌生葱桃李雀肉海藻菘菜出第一卷中

延年白朮丸療惡心數吐水不多能食少心力者方

白朮 乾薑 人參 厚朴炙
桂心各八分 細辛 茯苓 當歸
茯神 枳實炙 五味子 附子各六分炮
吴茱萸六分 遠志五分去心 旋復花四分 澤瀉五分

右十六味擣篩蜜和爲丸如梧子酒服二十丸日再服加至三十五丸忌桃李雀肉大酢生菜生葱猪肉冷水出第十七卷中

胃實熱方二首

千金凡右手關上脉陽實者足陽明經也病苦頭痛脉經云腸中堅痛而熱汗不出如温瘧脣口乾善噦乳癰缺盆腋下腫名曰胃實熱也

療胃實瀉胃熱湯方

梔子人二兩　芍藥四兩　白朮五兩　茯苓二兩

生地黃汁一升　射干三兩　赤蜜一兩　升麻三兩

右八味切以水七升煑六味取一升五合去滓下地黃汁兩沸次下蜜煎取二升分三服老小以意服之忌桃李雀肉酢物蕪荑等

又方

灸膝下三寸兩脚三里空各三十壯主胃中熱病

胃虛寒方七首

千金右手關上脉陽虛者足陽明經也病苦脛寒不得卧惡風寒洒洒目急腹中痛耳虛鳴時寒時熱脣口乾面浮腫名曰胃虛冷也又療胃虛冷少氣口苦身體無澤補胃湯方

防風　栢子人　細辛　桂心

橘皮各二兩　芎藭　吳茱萸　人參各三兩

甘草一兩炙

右九味切以水一斗煑取三升分溫三服忌海藻菘菜生葱生菜等物

又補胃虛寒身枯絕骨諸節皆痛人參散方

人參　細辛　甘草各六分炙　桂心

當歸各七分　麥門冬七分去心　乾薑八分　遠志皮四分

蜀椒三分汗　吳茱萸二分

右十味爲散食後服方寸匕溫清酒進之忌海藻菘菜生葱生菜並出第十六卷中

范汪療胃氣虛不欲食四肢重短氣調和五藏并療諸病調中湯方

薤白一升切　枳實六枚炙　橘皮三枚　大棗十二枚擘

粳米三合　香豉六合

右六味切枳實橘皮棗以水六升先煑薤得四升內諸藥煑

取一升半適寒溫服中分服之良出第二十一卷中一方生薑四分

删繁療胃虛苦飢寒痛人參補虛湯方

人參 當歸 茯苓 桔梗

芎藭 橘皮 厚朴各炙三兩 桂心

甘草各炙二兩 白术五兩 吴茱萸二兩 大麥蘖二升炒

右十二味切以水一斗二升煮取三升去滓分三服忌海藻菘菜桃李雀肉生葱猪肉酢物等出第十一卷中

又白术八味等散方與前療同

白术 厚朴炙 人參 吴茱萸

麥蘖炒 茯苓 芎藭 橘皮各三兩

右藥擣篩爲散食前服方寸匕煖酒進之隨性服忌桃李雀肉大酢出第四卷中

延年補胃飲主胃氣虛熱不能食兼渴引飲方

茯苓四兩 人參三兩 橘皮二兩 生薑三兩

薤白一升切 豉五合綿裹 糯米二合

右七味切以水七升煮取三升去滓分温六服中間任食一日令盡忌酢物張文仲處出第一卷中

五膈方八首

病源五膈氣者謂憂膈恚膈氣膈寒膈熱膈也憂膈之爲病胷中氣結煩悶津液不通飲食不下羸瘦不爲氣力恚膈之爲病心下苦實滿噫輒酢心食不消心下積結牢在胃中大小便不利氣膈之爲病胷脅逆滿噎塞胷膈不通噫聞食臭寒膈之爲病心腹脹滿欬逆腹上苦冷雷鳴繞臍痛食不消不能食肥熱膈之爲病藏有熱氣五心中熱口中爛生瘡骨煩四肢重脣口乾燥身體頭面手足或熱腰背疼痛胷痺引背食不消不能多食羸瘦少氣及癖也此是方家所説五膈形證也經云陽脉

結謂之膈言憂恚寒熱動氣傷神而氣之與神並爲陽也傷
動陽氣致陰陽不和而腑藏生病結於胷膈之間故稱爲膈氣
衆方說五膈互有不同但傷動之由有五故云五膈氣出第十
三卷中

備急膈中之患名曰膏盲湯丸徑過針灸不及所以作丸含之
令氣勢得相熏染有五膈要丸方

麥門冬十分去心　椒六分汗　遠志　附子炮
乾薑　人參　桂心　細辛各六分
甘草十分炙

右九味擣篩以蜜和丸如彈子以一枚著牙齒間含稍稍嚥
汁日三主短氣胷滿心下堅冷氣此病有十許方率皆相類
此丸最効五膈者謂憂膈氣膈恚膈熱膈寒膈也忌猪肉生
菜海藻菘菜生葱千金肘後文仲同出第三卷中

張文仲五膈丸方

吴茱萸　麴　杏人去皮尖熬　乾薑
蜀椒汗去閉口者及目　好豉熬令色變

右六味等分擣篩蜜和丸如梧子飲服七丸日三忌生冷此
方出隱居効驗備急肘後同出第三卷中

延年秘錄凡憂膈氣膈食膈寒膈飲膈五病同藥常以憂愁思
慮食飲而得之若寒食食生菜便發其病苦心滿不得氣息引
脊痛如刺之狀食則心下堅大如粉絮大痛欲吐吐則差飲食
不得下甚者乃手足冷上氣欬逆喘息氣短療之九物五膈丸方

麥門冬去心　蜀椒汗各三兩　遠志去心三兩　甘草五兩炙
附子一兩炮　乾薑三兩　人參四兩　桂心三兩
細辛三兩

右藥擣篩蜜和微使淖置有蓋器中先食服大如彈子丸一

丸置喉中稍嚥之喉中胷中當熱藥力稍盡復含一丸日三
四夜一二服服藥七日愈二十日平復若不能含者可分一
大丸作二小丸盡服之唯夏月合乃益麥門冬甘草人參耳
其餘不異神良椒當以銅器熬如火上使極熱下置地内椒
器中熟攪之須臾汗出便擣名曰起椒力有熱亦去其毒非
令有熱也忌海藻菘菜猪肉冷水生葱生菜千金集驗同
不能具於此方録用之耳

古今録驗大五膈丸療膈中遊氣上下無常處藏有虚冷氣迫
咽喉胷滿氣逆脅有邪氣食已氣滿羸瘦著牀骨立往來寒熱
腹中不調或下痢嘔逆欬嗽骨肉銷盡服之令人能食長肌肉
強筋骨利五藏好顏色補不足益氣力方

細辛　桂心　黄芩　食茱萸
厚朴炙各三分　杏人三十枚去尖皮并兩人熬　乾薑　椒汗

遠志各三分去心　小草　芍藥　附子炮
當歸各二分　黄連二分

右十四味擣篩蜜和服如梧子二丸日三不知加之以知爲
度忌猪肉冷水生葱生菜等

又五膈丸療憂膈氣膈食膈寒膈飲膈異病同藥神方

人參　附子炮　遠志去心　桂心
細辛各四分　乾薑　蜀椒各五分汗

右七味擣篩以蜜和服如彈丸著牙下㕮咀嚥之若病劇者
日三夜再并療諸毒風注氣腹中百病皆應當得真新好藥
即可中病耳神祕妙方不傳忌生葱生菜猪肉冷水等物

又療邪氣嘔逆吸氣五膈爲病五藏俱虚則受風冷五藏有邪
呼吸不足陰注於内陽結於外陰陽錯亂語言無常侠舌左右
狀如結氣喉咽不利氣出不入此血氣裹微藏凝冷氣成之服此

丸安穀通氣温藏五膈丸出僧深方

蜀椒汗一升　乾薑二兩　桂心二兩　芍藥一兩半

半夏洗　細辛　茯苓各一兩　前胡一兩半

右八物擣篩蜜和服如彈丸一枚喉中稍稍吞之可增至三丸或冷則加遠志一兩佳日再忌羊肉餳生葱生菜酢物

又療胷痛達背膈中煩滿結氣憂愁飲食不下藥悉主之宜丸方

半夏一分削去皮熬　甘草炙　遠志去心各四分　乾薑

桂心　細辛　椒去目汗　附子炮各二分

右八味擣篩以蜜和爲丸先飯酒若粳米飲服如梧子五丸日三稍增至十丸忌海藻菘菜羊肉餳猪肉冷水生葱生菜並出第十八卷中

經心録五膈丸療寒冷則心痛咽中如有物吐之不出咽之不入食飲少方

乾薑三兩　麥門冬二兩去心　附子一兩炮　細辛二兩

蜀椒一兩汗　遠志一兩去心　甘草一兩炙　人參二兩

食茱萸二兩　桂心三兩

右十味蜜和爲丸如梧子服五丸日二忌猪肉冷水海藻菘菜生葱生菜千金同出第二卷中

七氣方三首

病源七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣凡七種氣積聚堅大如柸若柈一作盤蒲官切在心下腹中疾痛欲死飲食不能時來時去每發欲死如有禍祟此皆七氣所生寒氣則嘔吐惡心熱氣則說物不竟言而迫一云恍惚不章怒氣則上氣不可忍熱痛上搶心短氣欲死不得氣息恚氣則積聚在心下心滿不得飲食喜氣則不可疾行不能久立憂氣則不可劇作暮卧不安席愁氣則喜忘不識人語置物四方還取不得去處若聞急則四肢手

足筋攣不能舉狀如得病此是七氣所生男子卒得飲食不時所致婦人則產中風餘疾出第十三卷中千金同千金七氣丸方

烏頭炮七分　紫菀　前胡　半夏洗

細辛　丹參　茯苓　芎藭

桃人去皮尖并兩人熬　吳茱萸　桂心　桔梗

石膏各三分研　人參　甘草　防葵各四分千金作防風

大黃七分　乾薑二分　蜀椒二分汗　昌蒲三分

右二十味擣篩爲末蜜和丸酒服如梧子三丸日三加至十丸一方去半夏加甘遂三分忌海藻菘菜羊肉餳猪肉冷水生葱大酢生菜一方有芍藥無昌蒲

又七氣丸主七氣七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣此七氣爲病皆生積聚堅牢如柸心腹絞痛不能飲食時去時來發則欲死凡寒氣狀吐逆心滿熱氣狀恍惚眩冒失精怒氣狀上氣不可當熱痛上湯心短氣欲絕不得喘息恚氣狀積聚心滿不得食飲喜氣狀不可疾行久立憂氣狀不可苦作臥不安席愁氣狀平故怒氣善忘四肢跗腫不得舉止亦療產後中風餘疾方

大黃十分　椒二分　人參　半夏洗

芎藭　柴胡　甘草炙　桔梗

石膏　昌蒲　桃人去皮尖兩人熬　吳茱萸

茯苓各三分　乾薑四分　細辛三分

右十五味擣篩蜜和丸如梧子酒服三丸日三加至十丸忌羊肉餳生葱海藻菘菜猪肉生菜酢物

又七氣湯療虛冷上氣勞氣方

半夏一升洗　生薑十兩　人參　桂心

甘草炙各一兩

右五味切以水一斗煮取三升分爲三服日三忌羊肉餳生葱海藻菘菜並出第十七卷中

氣噎方六首

病源此由陰陽不和藏氣不理寒氣塡於胷膈故氣噎塞不通而謂之氣噎令人喘悸胷背痛也出第二十卷中

廣濟療噎胷脅氣滿每食氣噎通氣湯方

半夏洗　生薑各六兩　橘皮　桂心各三兩切

右四味切以水八升煮取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里服忌羊肉生葱餳等出第一卷中

深師療胷滿氣噎通氣湯方

半夏八兩洗　生薑六兩　桂心三兩　大棗三十枚擘

右四味切以水八升煮取三升分服五合日三夜一忌羊肉餳生葱千金同出第二十二卷中

集驗療氣噎煎方

蜜　酥　薑汁各一升

右三味合和微火煎五六大沸取如大棗二枚內酒中飲之直抄服之亦好千金古今錄驗同

又通氣噎湯方

半夏三兩洗　桂心三兩　生薑八兩　羚羊角三兩

右四味切以水八升煮取三升分服半升日再服忌羊肉生葱餳古今錄驗同並出第四卷中

救急療喉中氣噎方

半夏洗　柴胡　生薑各三兩　羚羊角屑一法三兩

犀角屑　桔梗　昆布　通草

甘草炙各二兩

右九味切以水八升煮取三升分三服忌羊肉餳猪肉海藻菘菜等

古今錄驗羚羊角湯療噎氣不通不得下食方

羚羊角屑二兩 厚朴炙 吳茱萸 乾薑各三兩

通草 橘皮各二兩 烏頭十五枚炮

右七味切以水九升煮取三升分三服日三忌猪肉冷水深

師千金同出第二十七卷中

諸噎方一十二首

病源夫陰陽不和則三焦隔絶三焦隔絶則津液不利故令氣

塞不調理也是以成噎此由憂恚所致憂恚則氣結氣結則不

宣流使噎噎者噎塞不通也出第二十卷中

深師療噎方

羚羊角屑 前胡 甘草各一兩 人參

橘皮各二兩

右五味切以水六升煮取二升分四服忌海藻菘菜

又方

鸕鷀喙

右一物當噎時以銜之則下肘後同

又方

羚羊角

右一物多少自在末之飲服亦可以角摩噎上良並出第

二十二卷中

廣利方療因食即噎塞如炙肉臠在咽中不下方

吳射干六分 升麻四分 桔梗四分 木通十二分

赤茯苓八分 百合八分 紫菀頭二十一枚

右七物切以水二大升煎取九合去滓分溫三服食後良久

服忌猪肉酢物出第四卷中

千金理諸噎方

常食乾粳米飯即不噎

又方

炭末細羅蜜丸如彈子大含少細細嚥津即下集驗同並出第十六卷中

集驗療噎方

取頭垢如棗大以粥若漿水和服之肘後深師同出第十卷中

必効主噎方

鐵捺大推盡力則下仍令坐之

又方

以酢煮麪糊噉之則差此只可一兩日差欲長久絶者取溲爲丸如彈子酢中煮熱於水中漉却及熱則食二十丸神驗不過三兩度則差大効

又半夏湯主噎方

生薑四兩 半夏一升洗 石膏四兩碎 小麥一升完用

吴茱萸一升 赤小豆二十顆 大棗二十一顆 人參

甘草炙 桔梗 桂心各二兩

右十一味切以酒二升水八升煮取三升分三服忌猪羊肉海藻菘菜餳生葱等古今録驗有栝樓無桔梗名乾薑湯不用生薑

又方

杏人二兩去尖皮并兩人熬 桂心二兩

右二味末之蜜和丸含之如棗核許稍稍嚥之臨食先含彌極効忌生葱千金同並出第二卷中

古今録驗療噎方

蘆根三斤

右一味切以水一斗煮取四升分四服出第二十七卷中

卒食噎方九首

病源此由藏氣冷而不理津液澀少而不能傳行飲食故食入則噎塞不通故謂之食噎胸內痛不得喘息食不下是故噎也

肘後療卒食噎方

橘皮（三兩）

右一味切以水三升煑取一升頓服之

又方

舂杵頭糠置手巾角以拭齒立下（集驗深師千金同並出第五卷中）

深師療卒噎法

傍人可緩解衣帶勿令噎者知則愈

又療卒噎方

與共食人當以手捉噎人筋問曰此等何物噎人當荅言筋共食人云噎下去則立愈

又療卒噎不下方

水一柸　刀一口

右二物先以刀攪畫水已後盡飲之則下（出第二十二卷中）

集驗療醋噎方

羌活（五兩）

擣用水一升浸三宿每日温服五合差

又療氣噎不下食兼嘔吐方

半夏（四兩洗）　生薑（三兩各切）

右二味以東流水二大升煎取一升去滓温服三合三日服忌羊肉餳（並出第五卷中）

備急療卒食噎不下方

取蜜含之則下千金集驗肘後同

又方

　取老牛涎沫如棗核大置水中飲之終身不有噎必効

　肘後深師千金同並出第三卷中

　五噎方三首

病源夫五噎謂一曰氣噎二曰憂噎三曰食噎四曰勞噎五曰思噎雖有五名皆由陰陽不和三焦隔絶津液不行憂恚嗔怒所生謂之五噎噎者噎塞不通也出第二十卷中

古今録驗五噎丸療胷中久寒嘔逆逆氣隔飲食不下結氣不消氣噎憂噎勞噎食噎思噎氣噎者心悸上下不通噫噦不徹胷脅苦痛憂噎者天陰苦厥逆心下悸動手足逆冷勞噎者苦氣隔脅下支滿胷中塡塞令手足逆冷不能自温食噎者食無多少唯胷中苦塞常痛不得喘息思噎者心悸動喜忘目視䀮䀮比皆憂恚嗔怒寒氣上入胷脅所致療之方

　乾薑　蜀椒汗　食茱萸　人參

　桂心各五分　細辛　白朮　茯苓

　附子炮各四分　橘皮六分

右十味擣篩以蜜和爲丸如梧子酒服三丸日再不知漸增忌桃李雀肉大酢猪肉冷水生葱生菜酢物出第二十七卷中

經心録五噎丸主五種之氣皆令人噎方

　人參　半夏　桂心　防葵一方用防風小草各二兩

　附子炮　細辛　甘草炙各二兩　食茱萸五合

　紫菀　乾薑　芍藥　枳實炙

　烏頭各六分炮

右十三味擣篩以蜜和爲丸如梧子大服五丸日三不知加

至十五丸忌羊肉餳海藻菘菜猪肉生葱生菜千金同出
第二卷中

集驗噎塞不通方

營實根 十二分

右一味擣爲散酒下方寸匕日三服出第五卷中

諸骨哽方三十五首

肘後療食諸魚骨哽百日哽者方

用綿二兩以火煎蜜内一段綿使熱灼灼爾從外薄哽所在處灼瓠以熨綿上若故未出復煮一段綿以代前并以皂莢屑少少吹鼻中使得哽出矣祕方不傳禮云魚去乙謂其頭間有骨如乙字形者哽入不肯出故也

又方

取捕魚竹笱鬚燒末飲之魚網亦佳

又療食諸肉骨哽方

白雄雞左右翮大毛各一枚燒末水服一刀圭也仍取所食餘者骨左右手反覆擲背後則丁也文仲備急同

又方

燒雞足末服方寸匕酒下立出深師同

又方

生艾蒿數升水酒共一斗煮取三四升稍稍飲之深師同

凡療病皆各以其類豈宜以鸕鷀療肉骨狸虎療魚哽耶至於竹篾薤白嚼筋綿蜜事乃可通爲諸哽用耳又有呪術小小皆須師解故不備載出第五卷中

深師療食魚骨哽方

捕魚網燒飲服刀圭匕良是魚哽燒魚網服之良

又療哽及刺不出方

服薔薇灰末方寸匕日三亦療折箭刺入膿囊不出堅燥及鼠撲服之十日哽刺皆穿皮出効

又療鐵棘竹木諸刺在肉中折不出及哽不下方

半夏洗二兩 白斂二兩

右二物擣篩酒服半錢匕日三寧從少少起者半夏戟人喉中故也忌羊肉餳等加乾薑一兩尤佳

又方

鼠腦厚塗瘡上則出亦可用墳鼠大効

又療哽方

螻蛄腦

右一物呑即下亦療刺不出塗刺瘡上

又療咽哽方

取魚尾著衣領令下推立下

又方

白斂白芷等分擣散飲服刀圭

又療食哽方

鷹糞燒

右一物下篩服方寸匕虎狼鵰屎皆可服之佳

又療骨哽咽不得下飲食方

白雞翼翮大毛各一枚著銅器中燒之焦作灰飲服一刀圭立下

又療哽方

半夏洗五兩 白芷五兩

右二物擣篩服方寸匕則嘔出忌羊肉餳

又方

以東流水一杯東向坐以手指畫水上作龍字訖飲

水不自焼書令他人持手書良

又方

凡書文曰天有門地有根諸家入口者皆當得呑集驗同並出第二十二卷中

千金療哽方

取鹿筋漬之濡索之大如彈丸持筋端呑之候至哽處徐徐引之哽著筋出集驗同

又方

極吹之食骨鯁燒虎狼屎服

又方

末虎骨若狸骨服方寸匕集驗同

又方

服瞿麥末方寸匕集驗同古今録驗云兼主折刺不出

又方

呑猪膏如雞子大不差更呑差止古今録驗同

又療諸哽方

作竹篾刮令滑綿纏内咽中令至哽處可進退引之哽即出小品古今録驗深師同

又療諸哽方

鸕鷀屎末服方寸匕集驗古今録驗同

又療魚骨哽方

口稱鸕鷀鸕鷀則下並出第二十六卷中

張文仲療食諸魚骨哽方

以魚骨插頭上則立下陶云因蠱欬則出肘後備急同

又方

小嚼薤白令柔以繩繫中央持繩一端呑薤到哽處引哽當隨出集驗古今録驗深師備急千金同

又療魚骨哽在喉中衆法不能去者方

取飴糖丸如雞子黄大吞之不去又吞亦漸大作丸比用得効也肘後備急千金集驗小品同

又療食中呑髪哽不去繞喉者方

取梳頭髪燒灰飲服一錢匕肘後備急集驗千金同

並出第三卷中

救急療哽方

好蜜以一匙抄稍稍嚥之令下良文仲同

又療魚骨哽在喉中方

以少多硇砂口中咀嚼嚥之立下出第七卷中

必効療魚骨哽方

含水獺骨立出小品同

又方

魚網覆頭立下千金云燒灰服半匕小品同出第二卷中

古今録驗療魚哽骨横喉中六七日不出方

取鯉魚鱗皮合燒作屑以水服之則出也未出更服之取出爲度出第二十九卷中

雜誤呑物方一十七首

肘後療誤呑鉤方

若繩猶在手中者莫引之但益以珠璫若薏子輩就貫之著繩稍稍令推至鉤處小小引之則出

又方

以小羊喉以沓繩推至鉤處當退脱小引則出

又方

但大戾頭四向顧小引之則出

又方

常思草頭一把二升水淘灌之十餘過而飲之

又療誤呑諸木竹叉輩方

取布刀故鋸燒漬酒中以女人大指甲二枚燒末內
酒中飲之

又方

若是桃枝竹釵但數數多食白糖自消去

又療以銀釵簪筯擿吐因氣吸誤呑不出方

多食白糖漸漸至十斤當裹物自出此說與葛氏
小異並出第五巻中

深師療誤呑鉤方

虎珀珠

右一物貫著鉤繩推令前入至鉤所又復推以牽引出矣若
水精珠卒無珠堅物摩令滑用之也出第二十二巻中

千金療誤呑環若指彄方

燒鴈毛二七枚末服之鵝羽亦佳備急文仲同

又誤呑珠銅鐵而哽者方

燒弩銅牙令赤內酒中飲之立愈出第二十六巻中

張文仲療呑諸珠璫鐵而哽方

燒弩銅牙令赤內水中飲其汁立愈肘後備急同

又療誤呑錢方

擣火炭末服方寸匕則出肘後小品集驗千金備急深師同

備急葛氏誤呑釵方

取薤暴令萎煑令熟勿切食一大束釵則便隨出生
麥菜若筋縷皆可用良効千金肘後同

又誤呑釘及箭金鍼鐵物等方

多食肥羊肉脂及諸肥肉自裹出肘後千金文仲同
並出第五巻中

古今録驗療誤呑銀鐶及釵者方

取飴糖一斤一頓漸漸食盡多食之鐶及釵便出小品集驗千金同

又方

取水銀一兩分服之釵便下去也亦可以胡粉一兩擣調之分再服食銀令如泥也若吞金銀物在腹中皆服之令消烊出之

又療誤蠑鍼方

取精吸鍼磁石末酒白飲服一方寸匕解曰磁石特能吸取鍼難云令吞鍼哽在喉中而服磁石末入腹耶若含磁石口中者或吸錢出耳二理詳取其義焉小品集驗千金同出第二十九卷中

外臺祕要方卷第八

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔校勘